

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



INFLUENZA A' IN DENEMARKEN

Enkele weken geleden maakten persberichten gewag van het uitbreken van influenza in Denemarken. Volgens een bericht van dr P. VON MAGNUS, leider van het departement Influenza van het Rijksseruminstituut in Kopenhagen, betrof het plaatselijke epidemieën van een klinisch niet ernstig karakter, doch met een hoge morbiditeit. 28 November l.l. werd uit Kopenhagen aan de werkgroep Influenza van het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde te Leiden gemeld, dat thans in Denemarken influenza-stammen van het A' type zijn geïsoleerd.

Er bestaat dus ook in ons land een zekere kans op het opnieuw verschijnen van influenza (A') in de komende weken.

Ondergetekende wil nogmaals dringend wijzen op de talrijke gevallen van secundaire staphylococcus-pneumonieën, die bij de influenza in de huidige periode verschijnen en die zeer vaak foudroyant toxinaemisch verlopen. Zeer vroegtijdige herkenning is noodzakelijk terwille van een beschutting van de patiënt met penicilline. Wanneer men bedenkt, dat in het begin van 1949 in de tijd van 8 weken 2200 personen in ons land aan influenza zijn overleden (waarschijnlijk merendeels aan pneumonieën), dan moge deze waarschuwing niet als overbodig gelden. Patiënten boven de 50 jaar geve men bij influenza prophylactisch het liefst penicilline, bijvoorbeeld 300.000 E procaine-penicilline per dag, gedurende 5 dagen.

Leiden 29 November 1950.

J. MULDER

IETS OVER DE BEHANDELING VAN ECZEEM

In het waardevolle artikel van prof. dr J. R. PRAKKEN over eczeembehandeling (blz. 3108 e.v.) is in het recept van eau d'Alibour op blz. 3114 de hoeveelheid van het gebruikte aq. camphor. zoek geraakt.

Verder verschilt de opgegeven samenstelling niet onbelangrijk van het standaardrecept voor Liquor Alibouri in de *Codex*. Zou de schrijver de reden hiervan willen mededelen?

Amsterdam, 14 November 1950

H. JONKER

Het recept voor verbandwater volgens ALIBOUR op blz. 3114, is door het wegvallen van een getal verminkt; het moet zijn: sulf. cupric 0.5, sulf. zincic. 1.75, aq. camphor. 50, aq. ad 1000.

Verbandwater met de combinatie van sulf. cupric. en sulf. zincic., in verschillende hoeveelheden en met allerlei toevoegingen, vindt men aangeduid als eau d'Alibour of Dalibour. Het bovengenoemde recept heeft mij bij langdurig gebruik bewezen goed te voldoen. Voor grote afnemers kan men de concentraties 20 maal zo groot maken en de patiënt zelf verdunningen laten maken, bijv. 3 lepels op 1 liter water.

Amsterdam 24 November 1950

J. R. PRAKKEN

RIBCARIES, EEN MISLEIDEND BEGRIP

Naar aanleiding van bovenstaand artikel van collega NYST (*N.T.v.G.* 94, IV, 44, 4 Nov. 1950) zou ik gaarne enige opmerkingen willen maken. Onze ervaring in de ROLLIER-clinieken te Leysin komt in grote trekken overeen met die van collega NYST. Ook wij zijn van mening dat een hoog percentage der gevallen van ribtuberculose-koud thoraxwandabsces, een gevolg is van een lymphogene