

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten



ARTSEN VOOR KOREA

Het Bureau Internationale Technische Hulp berichtte mij dat de Permanente Vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties te New York verzocht een voordracht te willen indienen van kandidaten voor de functie van medicus met praktische ervaring in volksgezondheidsvraagstukken bij de United Nations Korean Rehabilitation Aid.

Nadere inlichtingen zijn bij ondergetekende te verkrijgen.

's-Gravenhage, 14 December 1951

G. VAN DEN BERG

*Directeur-Generaal voor de Internationale
Volksgezondheidszaken.*

Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid

BEHANDELING VAN STRUMA JUVENILIS PARENCHYMATOSA MET JODIUM

De struma juvenilis¹⁾ bewijst een zekere functionele minderwaardigheid van de schildklier ten opzichte van de hormonale revolutie van de puberteit. In deze parenchymateuze puberteitsstruma, die nog geheel reversibel is, kan een echte thyreotoxische struma ontstaan, evenals een diffuse of gelocaliseerde, groot- of klein-folliculaire colloidstruma. Daarom moet de patiënt onder contrôle blijven. Deze contrôle is speciaal noodzakelijk wanneer de beproefde therapie met sol. LUGOLI wordt toegepast. Evenals LANZ heb ikzelf herhaaldelijk het ontstaan van hyperthyreotische en thyreotoxische verschijnselen waargenomen na maandenlang gebruik van kleine doses jodium bij patiënten, die niet geregeld werden gecontroleerd.

Het zou jammer zijn, wanneer deze ervaringen — zoals vele van de oudere generatie — in het vergeetboek zouden raken. De labiliteit van de struma juvenilis kan worden verminderd door de jodiumbehandeling te combineren met de toediening van ruime doses calcium en vitamine A.

Amsterdam, 2 December 1951.

H. FERIZ

Het is gevaarlijk om meningen en stellingen van een kwarteeuw geleden, zelfs die welke als bewezen golden, in de tegenwoordige tijd te willen verdedigen zonder rekening te houden met de vooruitgang van de medische wetenschap. Zeker geldt dit voor vage begrippen als „functionele minderwaardigheid”

Het is thans op grond van uitgebreid experimenteel onderzoek en klinische observatie wel bewezen, dat zwelling van de schildklier, dus struma, in de meeste gevallen *niet* ontstaat door een afwijking van de schildklier zelf, maar door invloeden van buiten. De enkele gevallen, waarin misschien een afwijking van de schildklier zelf aan de vergroting ten grondslag ligt, kunnen zeker niet als bewijs voor een zelfde mechanisme in alle gevallen van schildkliervergroting worden aanvaard.

Het spreekt vanzelf dat men iemand, die men medisch behandelt, onder contrôle houdt; dit behoeft niet afzonderlijk te worden vermeld. Het gevaar voor hyperthyreoidisme is overigens bij de voorgestelde dosis jodium vermoedelijk uiterst gering.

Omtrent de schadelijkheid van een niet nader bepaalde „kleine dosis” kan, zo als vanzelf spreekt, niets zekers worden gezegd.

De invloed van calcium en vitamine A op het voorkomen van hyperthyreoidisme staat naar de mening van de redactie niet voldoende vast.

REDACTIE

¹⁾ Zie vraag no 51, *N.T.v.G.* 95, 3598, 1951.