

Tijdschrift ter sprake gekomen en heeft zelfs tot een discussie aanleiding gegeven⁴. Intussen zijn wij het persoonlijke, dat een discussie kenmerkt, gelukkig te boven. Gaarne herinner ik opnieuw aan de uitspraak der studiec ommissie ter voorlichting van het Hoofdbestuur der Maatschappij inzake de Reorganisatie van het Hoger Onderwijs⁵. Deze commissie, samengesteld uit leden van zeer diverse pluimage, sprak zich over „de toekomstige behoefte aan medici” als volgt uit:

„Een regeling van het aantal studenten in de geneeskunde — die dus niet altijd een streven naar beperking behoeft te zijn — acht onze Commissie ook voor de toekomst gewenst”.

„Er zal moeten worden gestreefd naar een evenwicht tussen de geschatte behoefte aan artsen in een nabije toekomst en de capaciteiten van het universitaire opleidingsapparaat”.

Een verwezenlijking van dit denkbeeld, die in de wettelijke regeling van ons Hoger Onderwijs enige wijziging zou eisen, kan slechts door een Staatscommissie worden voorbereid. Bij een dergelijke voorbereiding zou de quantitative studie van het Centraal Planbureau zonder twijfel worden gewaardeerd en dientengevolge meer dan thans tot haar recht komen.

Literatuur: ¹P. J. VERDOORN en F. TH. VAN DER MADEN, *Enige gegevens betreffende de toekomstige behoefte aan medici*. Uitg. Kon. Ned. Maatsch. t.b.d. Geneeskunst, 1952. ²F. WIBAUT (1952) *Medisch Contact* 7, 741. ³J. J. VAN LOGHEM (1948) *N.T.v.G.* 92, 1202. ⁴J. J. VAN LOGHEM en L. A. HULST (1951) *N.T.v.G.* 95, 498, 658 en 660. ⁵J. F. BUMA, L. F. C. VAN ERP TAALMAN KIP, P. FORMIJNE, J. J. VAN DER HORST, J. H. TUNTLEER en F. WIBAUT (1951) *Medisch Contact* 6, 378.

Maart 1953

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten.



PRURITUS VULVAE ET VAGINAE IN GRAVIDITATE

Naar aanleiding van vraag 10 en het antwoord er op¹ zou ik de volgende opmerkingen willen maken.

Bij elke pruritus moet men nagaan of er hyperglycaemie bestaat. Is er colpitis of vulvitis, dan moet deze worden behandeld. Monilia en Trichomonas kunnen met een der bestaande middelen worden bestreden. Voor strenge asepsis moet bij de intra-vaginale behandeling worden gewaakt. Vaginale irrigaties zijn verboden. Tegen de applicatie van etsende stoffen zoals nitras argenti moet worden gewaarschuwd. Is er een intertrigineus eczeem, dan zijn geregelde afwassing met VEIEL's waswater en het verbod van het gebruik van zeep aan te bevelen. Zalven moeten worden ontraden.

Indien er geen plaatselijke afwijking is aan te tonen, kan men een echte zwangerschapspruritus aannemen, die echter meestal over het hele lichaam is uitgebreid. Hiertegen helpen meestal onderhuidse inspuitingen van vloeistof van RINGER, bij voorbeeld 5 dagen achtereen 200 cm³ per dag.

Van toediening van serum van gezonde zwangeren zag ik geen succes; de injectie van alcohol onder de huid heb ik nooit nodig gehad.

¹Vraag 10 (1953) *N.T.v.G.* 97, 489.

Utrecht, 28 Februari 1953

W. P. PLATE

Aangezien gegeven was, dat de zwangere gezond was, werd verondersteld dat het bloedsuikergehalte binnen normale grenzen lag. Naar men mag hopen is iedere arts er langzamerhand van overtuigd dat jeuk herhaaldelijk één van de eerste verschijnselen van diabetes mellitus is.

De ervaringen met het inspuiten van de zoutoplossing van RINGER ondershuids zijn niet algemeen zo gunstig, dat wij deze behandeling meenden te moeten aanbevelen.

REDACTIE