

Behalve deze hoofdonderwerpen zijn er nog ongeveer 140 voordrachten. Er zullen ook talrijke films op keel-neus-oorheelkundig gebied worden vertoond.

De Nederlandse Keel-Neus-Oorheelkundige Vereniging zal Maandagavond 8 Juni de leden van het Congres ontvangen, terwijl Rijk en Gemeente Amsterdam de congressisten Dinsdagavond 9 Juni een receptie zullen aanbieden.

Voor de dames, die de congresleden begeleiden is een uitgebreid programma samengesteld met excursies naar Aalsmeer, Haarlem, De Hoge Veluwe, Alkmaar, Delft en 's-Gravenhage. Zaterdag 13 Juni zal 's middags een gemeenschappelijke excursie van de leden en hun dames plaats vinden naar de Zuiderzeewerken.

Amsterdam, 13 Mei 1953

W. H. STRUBEN

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten.



DE MELAATSHEID IN DE BIJBEL

Het is jammer dat de discussie over dit onderwerp in het nummer van 28 Maart 1953 werd gesloten. Het ware immers van belang er op te wijzen, dat de reinigingsprocedure, waaraan oorlel, duim en grote teen te pas komen, volstrekt niet alleen betrekking heeft op de zaraäth-ziekte. Men vergelijkte Exodus, hoofdstuk 29, vers 20.

Jeruzalem, 4 Mei 1953

M. J. PERATH

(Aangezien deze opmerking uit het buitenland is gekomen, hebben wij gemeend haar als-
nog te moeten plaatsen, hoewel inderdaad de discussie reeds was gesloten. REDACTIE).

BEHANDELING VAN HET SYNDROOM VAN MULOCK HOUWER - SJÖGREN

In het redactionele antwoord¹ over de behandeling van het syndroom van SJÖGREN werd een voortreffelijk, door GODTFREDSSEN beschreven middel niet genoemd, waarop ik door collega VAN HEUVEN opmerkzaam werd gemaakt: Oogdruppels van 2 pCt salicylas natricus, 3-4 maal daags 1-2 druppels intraconjunctivaal. Bij 7 patiënten kon ik hiermede binnen 14 dagen toeneming van de traansecretie (3-10 mm³ bij de proef van SCHIRMER) en vermindering van de oogklachten bereiken. Na het einde der medicatie keerde de oude toestand binnen enkele dagen.

Ook mijn ervaringen met intraconjunctivale toediening van hyaluronidase bij 5 lijdens aan het syndroom van SJÖGREN zijn ongunstig (vermindering van de traansecretie, toeneming van de oogklachten). Cortison gedurende 14-30 dagen bij 2 zeer ernstige patiënten intraconjunctivaal toegediend deed de klachten verdwijnen, maar gaf geen verbetering van de traansecretie.

Literatuur: ¹Vraag en antwoord, bl. 1274.

Amsterdam, 18 Mei 1953

W. K. GAULHOFER

BEHANDELING VAN UNGUIS INCARNATUS

Het lezenswaardige artikel van wijlen collega LOOS¹ zou nog aan practische waarde winnen, indien werd vermeld, dat de aanleiding tot het ontstaan van de „incarnatie” veelal het ver wegknippen van de hoeken van de nagels van de grote tenen is. Ik zag dit euvel zeer vaak ontstaan in een verpleeginrichting, waar men met te veel ijver steeds weer deze nagels bewerkte. Een hoog percentage van de verpleegden kreeg unguis incarnatus. In het algemeen geve men de richtlijn, vooral ook aan verplegende personeel, dat de hoeken van de nagels van de grote tenen niet rond mogen worden afgeknipt, maar werkelijk als een hoek moeten blijven staan.

Literatuur: ¹J. W. Loos† (1953) *N.T.v.G.* 97, 1267.

Sneek, 17 Mei 1953

T. A. DONKERSLOOT