

er nog wel eens op de besmettingsgevaaren van de naald van FRANCKE worden gewezen en het advies worden gegeven steeds apparaten met losse, gesteriliseerde mesjes te gebruiken.

1S. I. DE VRIES e.a. (1953) *N.T.v.G.* 97, 1595.

's-Gravenhage, 27 Juni 1953

A. P. J. VAN DER BURG

De storende drukfout, waarop collega VAN DER BURG mij opmerkzaam maakt, is mij vermoedelijk bij de correctie ontgaan. Er behoort te staan: „Uit de histogrammen 1 en 2 kan men zien dat er met de methode van DUKE bij twee van onze proefpersonen een bloedingstijd werd gevonden die méér bedroeg dan $3\frac{1}{2}$ minuut, terwijl wanneer de vaccinostyle werd gebruikt, dit aantal 14 bedroeg”.

De bedoeling blijkt bovendien uit de vergelijking van de beide histogrammen. Opzettelijk heeft er geen statistische bewerking der uitkomsten plaats gehad. De nadruk is slechts gelegd op de toeneming van de spreiding indien men een methode op eigen gelegenheid gaat veranderen. Inderdaad zijn de geconstateerde verschillen niet zo groot, doch het gaat in de eerste plaats om het principe. Ons inziens behoort elke laboratoriummethode bij voorkeur internationaal gestandaardiseerd te zijn. Het uitgloeien van de naald van FRANCKE is — evenals dat met de vaccinostyle geschiedt — een gebiedende eis voor elke bepaling.

Amsterdam, 5 Juli 1953

S. I. DE VRIES

BRIEFWISSELING



SCHADELIJKE BIJWERKING VAN HET HEXAMETHONIUM-PRAEPARAAT C6-RETARD

Pharmaceutische Productenhandel en laboratorium „Pharmachemie” te Haarlem maakt ons erop opmerkzaam, dat de productie van het door haar gefabriceerde praeparaat C6-Retard op 11 Juli j.l. werd gestaakt, zulks naar aanleiding van de ervaring dat er zich bij patiënten, die het middel subcutaan toegediend hadden gekregen, ernstige bijverschijnselen hebben voorgedaan in de vorm van erysipelas-achtige infiltraten op de injectieplaatsen, gepaard met koorts, en in enkele gevallen met generaliseerd exantheem.

Deze bijverschijnselen zijn tot nu toe uitsluitend waargenomen bij een gedeelte van het product, waarvoor als oplosmiddel is gebruikt een oplossing van dextran met een vermoedelijk afwijkend moleculair gewicht. De medische afdeling van Pharmachemie adviseert C6-Retard voorlopig te vervangen door de gewone oplossingen van C6-chloride en C6-jodide in water, en van de C6-chloride-tabletten, van welke praeparaten geen enkele overgevoelighedsreactie is waargenomen.

REDACTIE

BERICHTEN



BUITENLAND

BELGIË. — HUISARTS EN SOCIALE EVOLUTIE. Het *Belgisch Geneesherenblad* van 15 Juni bevat rapporten, bestemd voor het 20 Juni 1953 te Antwerpen gehouden 34ste congres voor beroepsgeneeskunde. De titels luiden: „De omnipracticus tegenover de sociale evolutie in de huidige organisatie van de geneeskunde”, „Over de taak, die de universiteiten te vervullen hebben in de voorbereiding van de geneesheren tot hun sociale zending” en „Hoe kan het medisch beroep aangepast worden aan de sociale ontwikkeling?”

ENGELAND. — HUISARTS EN BEDRIJFSARTS. Het Central Ethical Committee van de British Medical Association houdt zich bezig met een memorandum over de toekomstige ontwikkeling van bedrijfsgeneeskundige diensten. Het legde de nadruk er op, dat in zulk een memorandum duidelijk moet uitkomen, dat een bedrijfsarts, die eerste hulp heeft verleend, de behandeling van de patiënt slechts met instemming van de huisarts mag voortzetten (*Brit. med. J.*, 27 Juni 1953, Suppl. bl. 311).

— DE MECHANISCHE RESPIRATOR VOOR LIJDERS AAN POLIOMYELITIS. Men geeft, gelijk reeds uit vorige berichten bleek, in Engeland veel aandacht aan apparaten ter behandeling van bulbair poliomyelitis. Het Ministerie van Gezondheid heeft aan de ziekenhuizen een cir-