

this lovely island. Clearly the public alarm, kindled by spectacular journalism, was unnecessary and unrealistic”.

Dr. AGERHOLM is door de opvatting van de Chief Medical Officer duidelijk geschokt. Naar haar mening hebben de journalisten en de duizenden, die van „this lovely island” wegbleven, in ruime mate van gezond inzicht (considerable wisdom) blijk gegeven.

Het pad van een inspecteur van de volksgezondheid leidt niet altijd over rozen.

Literatuur: ¹MARGARET AGERHOLM (1953) Epidemic Poliomyelitis and its Prevention. *Lance* 265, II, 287. ²J. J. VAN LOGHEM (1953) *N.T.v.G.* 97, 957.

J. J. VAN LOGHEM

BRIEFWISSELING



DR. D. SCHOUTE OVERLEDEN

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het droevige bericht, dat dr. D. SCHOUTE te Soest, Zondagmiddag 6 December j.l. plotseling is overleden. Het is ons voornemen in een later nummer uitgebreider op de betekenis van dr. SCHOUTE voor de beoefening van de Geschiedenis der Geneeskunde in Nederland, in te gaan.

REDACTIE

VERWISSELING VAN PLATEN 67 EN 68

Door een vergissing zijn enkele figuren op de platen 67 en 68 behorend bij het artikel van G. C. F. BRINKBOK, H. E. A. FERMIN en E. J. RENAUD (no. 48, bl. 3110) verkeerd afgedrukt. Bij het nummer van heden zijn ter vervanging daarvan twee nieuwe platen gevoegd, eveneens genummerd 67 en 68.

REDACTIE

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten.



MAZELEN BIJ JONGE ZUIGELINGEN

Naar aanleiding van het ingezonden artikel van collega J. JAGER¹ wilde ik het volgende opmerken. In het algemeen gesproken is de zuigeling tot ten hoogste 6 maanden weinig vatbaar voor mazelen, dank zij de omstandigheid dat in het zeer dicht bevolkte Nederland welhaast geen enkele moeder in haar jeugd is vrijgebleven van mazelen. De vorming van antistoffen behoeft echter niet zo volledig te zijn als men wel zou hopen, vandaar dat ook in Nederland enige kinderen zijn beschreven die tweemaal mazelen hebben gekregen. Hiermede is in overeenstemming dat een zuigeling meestal een voldoende passieve immuniteit van zijn moeder meekrijgt, evenwel lang niet altijd. Mazelen bij zuigelingen jonger dan 6 maanden is zeldzaam, maar zeker niet onbekend, zelfs niet bij zuigelingen wier moeders mazelen hebben gehad (HERMANN 1917). Mazelen pleegt tussen de 6e en 12e levensmaand lichter te verlopen dan bij kinderen van 2 tot 3 jaar, waarschijnlijk ten gevolge van nog aanwezige immuunstoffen (W. GUNN²).

Het medegedeelde geval van een zuigeling van nog geen 5 maanden met mazelen is zeker zeldzaam, maar geen unicum te noemen.

¹J. JAGER (1953) *N. T. v. G.* 97, 3017. ²W. GUNN, in STANLEY BANKS (1951) *Modern Practice in Infectious fevers*, II.

Hilversum, 28 November 1953

D. P. R. KEIZER

DE AETIOLOGIE VAN AANGEBOREN HARTGEBREKEN

Sinds de opkomst van de hartchirurgie is de diagnostiek van het aangeboren hartgebrek in het centrum van de belangstelling gekomen. Nu zou men zich ook graag een voorstelling willen maken, hoe de verschillende vitia zijn ontstaan.

Uit artikelen en verenigingsverslagen, opgenomen in dit *Tijdschrift*, blijkt dat de naar voren gebrachte verklaringen, zoals b.v. de phylogenetische theorie van SPITZER of de op-