

influenza-achtige ziektebeelden wordt door het influenza-virus zelf veroorzaakt. Er zijn vele dergelijke beelden, waarvan de verwekkers niet zijn geïsoleerd. Een dezer is onder andere de gewone verkoudheid. Verder kunnen bacteriële infecties der bovenste en onderste luchtwegen klinisch geheel de indruk maken van influenza. De indruk van hen, die op het ogenblik de influenza bestuderen met behulp van virologische contrôles, is niet dat de ziekte anders verloopt dan vroeger.

REDACTIE

INVLOED VAN DEFICIËNTE VOEDING TIJDENS ZWANGERSCHAP OP DE FOETUS

Naar aanleiding van het antwoord op vraag No. 50¹ wilde ik graag de volgende ervaring van 40 jaar geleden beschrijven:

Eén mijner patiënten had reeds herhaaldelijk in de 8-10e week van haar zwangerschap een abortus gehad, ondanks uiterste voorzichtigheid en beschermende maatregelen gedurende de hele periode van haar zwangerschap. Voorts had ik haar eens gecuretteerd en het cavum uteri geëst, in de hoop daardoor een gunstige invloed op het baarmoederslijmvlies uit te oefenen.

Zowel patiënte als haar echtgenoot waren strenge vegetariërs, gebruikten bovendien geen alcohol en nicotine.

Na onderling overleg werd patiënte door prof. TREUB te Amsterdam onderzocht. Ook deze kon geen afwijking constateren, doch gaf de raad over te gaan tot een gemengde voeding met veel dierlijk eiwit. Beide echtgenoten volgden zijn advies op, en zorgden ervoor dat de eerstvolgende zwangerschap pas na enige maanden intrad. Ditmaal werd de zwangerschap op de normale tijd beëindigd, doch het kind dat geboren werd, een meisje van normaal gewicht, bezat geen armen. Het kind is overigens voorspoedig opgegroeid en voorziet in haar eigen levensonderhoud.

Een paar jaar later werd een tweede kind geboren, ditmaal een jongen, zonder enig gebrek.

¹Vraag 50 *N.T.v.G.* (1954), **98**, 1388.

's-Gravenhage, 20 Mei 1954

N. J. A. F. BOERMA

BEDRUST-BEHANDELING BIJ ULCUS VENTRICULI ET DUODENI

In haar antwoord op vraag 49 geeft de Redactie als haar oordeel, dat in het algemeen vier weken bedrust voldoende zouden zijn. Met deze opvatting kan ik mij niet verenigen.

Naar mijn mening moet men bij een ulcuskuur vasthouden aan het oude voorschrift van zes weken bedrust, gevolgd door twee weken voor het mobiliseren. Beperking van de bedrustperiode tot bij voorbeeld vier weken heeft ten gevolge, dat recidieven vroeger en veelvuldiger ontstaan.

Er mag dus niet worden toegegeven aan de aandrang, die soms van de zijde van controlerend-geneeskundigen wordt uitgeoefend, tot bekorting van de ulcuskuur.

Rotterdam, 10 Mei 1954

A. W. HERWEIJER

Men huldigt tegenwoordig algemeen de opvatting dat 4 weken bedrust, gevolgd door 2 weken voor het mobiliseren, voldoende zijn om ongecompliceerde ulcera te genezen. Dit blijkt uit vele in de literatuur vastgelegde uitspraken, en het komt overeen met de ervaring van onze adviseur.

De aandrang van controlerende geneeskundigen om de ulcuskuur in ongecompliceerde gevallen te doen bestaan uit 4 weken bedrust en 2 weken voor het mobiliseren, is dus ons inziens wel gerechtvaardigd.

REDACTIE