

INGEZONDEN

Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten.



DE SUSPENSIE-OPERATIE VOOR ORTHOSTATISCHE INCONTINENTIA URINAE BIJ VROUWEN

Het artikel van de collegae MOONEN en AUSEMS¹ is mij aanleiding ook de aandacht te vestigen op een soortgelijke methodiek van retropubische „vesico-urethral suspension”. MARSHALL, MARCHETTI en KRANTZ^{2,3} beschreven een methode waarbij, door middel van zijden hechtingen, de voorste vagina-wand tegen de achterzijde van de symphysis omhooggetrokken wordt. Eventueel kan men ook nog de urethra reven (BALL^{4,5}). De resultaten zijn even bemoedigend als van een „sling”-operatie. De techniek is veel eenvoudiger en de kans op beschadigingen van de urinewegen nihil. Een nadeel van deze operatiemethode is dat periostitis en osteomyelitis van het os pubis het gevolg kunnen zijn.

Literatuur: ¹A. MOONEN en M. AUSEMS (1955) *N.T.v.G.* **99**, 329. ²V. MARSHALL, A. MARCHETTI en K. KRANTZ (1949) *Surg. Gynec. Obstet.* **88**, 509. ³A. MARCHETTI (1949) *Amer. J. Obstet. Gynec.* **58**, 1145. ⁴T. BALL (1950) *Amer. J. Obstet. Gynec.* **59**, 1243. ⁵T. BALL (1952) *Amer. J. Obstet. Gynec.* **63**, 1245.

Oldenzaal, 30 Januari 1955

M. M. MADLENER

LEEGSTAANDE SANATORIUMBEDDEN

Naar aanleiding van het artikel van M. M. HILFMAN¹ over de afnemende behoefte aan sanatoriumplaatsen en „tuberculosebedden” in ziekenhuizen, het volgende.

Voor het opkomende vraagstuk, nl. hoe de leegkomende bedden moeten worden gebruikt, lijkt mij de oplossing nogal voor de hand te liggen. Een blik over de grenzen van ons vaderland zal ons doen zien, dat de verheugende vermindering der tuberculose elders in Europa zich lang niet in die mate aftekent als hier, ja, dat in landen zoals Italië en Griekenland zelfs nog geen sprake is van een stelselmatige opsporing en behandeling van alle tuberculoselijders.

Is het nu niet mogelijk een aantal bedden in Nederland beschikbaar te stellen voor buitenlandse patiënten? Wellicht dat men aldus een begin zou kunnen maken van een Europese Sanatorium- en Ziekenhuis-„pool”. Het is jammer dat een dergelijke gedachte zo zelden in onze medische literatuur wordt aangetroffen. Naar mijn overtuiging houdt de taak van bv. de Nederlandse verenigingen ter bestrijding der tuberculose niet op bij de grenzen van Nederland.

Literatuur: ¹*N.T.v.G.* (1955) **99**, 589.

Amsterdam, 19 Februari 1955

C. H. A. WESTHOFF

DE GENESE VAN BRONCHIËCTASIEËN

Naar aanleiding van de klinische les van prof. HUIZINGA zijn er naar onze mening wel enkele punten, die eenzijdig worden belicht, vooral wat de genese van de bronchiëctasieën betreft.

Als plaatselijke oorzaken kunnen worden uitgesloten, zouden volgens de schrijver allergische factoren zeer sterk op de voorgrond staan bij het ontstaan van basale bronchiëctasieën. Inderdaad worden bij lijders aan bronchiëctasieën wel eens allergische verschijnselen waargenomen. Het is dan echter nog de vraag, of de allergische verschijnselen behoren bij het ziektebeeld der bronchiëctasieën of dat zij er een gevolg van zijn. Wij hebben nl. in verscheidene gevallen ervaren, dat na operatieve verwijdering van de bronchiëctasieën de verschijnselen, die op allergie zouden kunnen berusten, waren verdwenen. In heel enkele gevallen worden deze verschijnselen inderdaad erger. Wij bedoelen hiermede, dat soms asthma ontstaat na verwijdering van een ziek longgedeelte met bronchiëctasieën. Dit laatste is echter, volgens onze ervaring, uitzondering.

Volgens onze mening moet wat de aetiologie betreft veel meer de aandacht gevestigd worden op de zg. virus-pneumonieën (o.a. pneumonieën na mazelen en kinkhoest, ornithosis en primaire atypische pneumonie). In wezen is er hierbij echter geen echte pneumonie doch een bronchiolitis obliterans. Als een kleine bronchus oblitereert, kan men zich zeer goed het ontstaan van bronchiëctasieën voorstellen.

Het is opmerkelijk dat de plaats der zg. basale bronchiëctasieën, die bijna altijd gelocaliseerd zijn in de basale takken van de linker onderkwab, de lingula van de linker boven-