

MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN



FILMPAKKETJES VOOR METING ONTVANGEN RÖNTGENDOSIS

Op 1 januari van dit jaar werd door de Radiologische Werkgroep T.N.O. een begin gemaakt met de distributie van filmpakketjes voor het meten van de per veertien dagen ontvangen röntgendosis. Deze pakketjes bevatten twee verschillende films, gecombineerd met twee zo gekozen filters, dat de gevoeligheid van de beide films samen nagenoeg niet afhangt van de hardheid van de stralen. Dit maakt het mogelijk met hetzelfde filmpakketje zowel röntgenals gammadoses te meten. De pakketjes zijn kleiner en lichter dan in het buitenland gebruikelijk is.

Het spreekt vanzelf, dat het nut van deze metingen het grootst is daar waar zij leiden tot opsporing van de gelukkig zeldzame gevallen, dat de maximaal toelaatbare dosis regelmatig wordt overschreden. Maar ook voor de 75 pct van de deelnemers, die blijkens de ervaring gemiddeld niet meer dan een vijfde van dit maximum ontvangen, is een regelmatige controle nuttig, doordat deze telkens weer de aandacht vestigt op het gevaar van de stralen en de noodzaak van één verantwoorde werkmethode.

Degenen, die zich voor 1957 wensen te abonneren op deze dienst, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk op te geven bij Dr. L. H. M. VAN STEKELENBURG, Radiologische Werkgroep T.N.O., p/a N.V. KEMA, Utrechtseweg 210, Arnhem.

Per deelnemer bedraagt de abonnementsprijs f 30,— per jaar.

's-Gravenhage, 16 augustus 1956

A. E. WINKEL

Secr. Radiol. Werkgroep T.N.O.

INGEZONDEN

(Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten)



DIAGNOSE EN THERAPIE VAN GENITALE TUBERCULOSE BIJ DE VROUW

Naar aanleiding van de mededeling van SEELEN en STOLTE¹ over genitale tuberculose der vrouw resp. de steriliteit zou ik graag het volgende willen opmerken.

Bij tuberculeuze of tuberculose-achtige aandoeningen van het oog vindt men bijna nooit duidelijke tuberculeuze afwijkingen elders in het lichaam. Is dit ook zo bij tuberculose van het endometrium? Zijn er behalve verschijnselen zoals steriliteit en de pathologisch-anatomische afwijkingen, resp. positieve caviaproef, ook klinische verschijnselen die vaak een actieve tuberculose begeleiden, zoals koorts, nachtzweet, vermagering enz.? Het is voor ons internisten wel van belang te weten of het endometrium ook zo „zelfstandig” op de infectie reageert als bv. het oog.

Ik mis namelijk in het artikel de beschrijving van de algemene klinische verschijnselen van deze steriele vrouwen. Tijdens mijn sanatorium-opleiding zag ik wel vaak specifieke salpingitis met duidelijke buikkachten bij lijdende aan longtuberculose. Ovariumtuberculose is inderdaad zeer zeldzaam².

Hoewel nu „steriliteit” de vrouwen meestal niet het eerst naar ons, internisten, drijft, is het m.i. toch wel van belang iets te horen hoe het met de eventueel andere klachten gesteld is, die aanvankelijk wel door de internist worden beoordeeld. Het is bekend dat zg. latente genitale tuberculose een longhaard activeert (SUTHERLAND) en tot gewrichtstuberculose aanleiding kan geven, maar het is ook nuttig, te weten met welke algemene verschijnselen wij bij zo'n tuberculeuze endometritis te maken kunnen hebben.

Zou de ziekte van Besnier-Boeck bij deze waarschijnlijk meestal weinig algemene verschijnselen gevende aandoeningen ook een betekenis kunnen hebben?

Literatuur: ¹J. C. SEELEN en L. A. M. STOLTE (1956) *Ned. T. Geneesk.* **100**, 1912. ²M. HOMMES (1936) *Ned. T. Geneesk.* **80**, 4529.

Winschoten, 14 juli 1956

M. HOMMES

Naar aanleiding van het artikel van Dr. J. C. SEELEN en Prof. Dr. L. A. M. STOLTE¹ over diagnose en therapie van de genitale tuberculose bij de vrouw zou ik graag het volgende willen opmerken.