

are required to fulfil the nursing service needs of hospital or public health agency”.

5. „Participating with other members of the team in analysing the health needs, determining the services needed, and planning the construction of facilities and the equipment needed to carry out those services effectively”.

Uit deze gedachtengang volgt, dat de verpleegkundige vorming een brede basis behoeft en dat het aantal leiding gevende figuren zich, zowel op onderwijsgebied als op organisatorisch gebied, zal uitbreiden. Velen verlangen reeds, dat de verpleegkundige opleiding zal worden losgemaakt van dagelijkse praktische werkzaamheid in het ziekenhuis en overgedragen aan verpleegkundige scholen. De aangewezen plaats voor een dergelijke school is dan een medisch centrum met medische faculteit.

Uit het voorgaande laat zich tevens de behoefte aan „post-basic education” afleiden. Zij, die bestemd zijn voor taken van onderwijs, inspectie, administratie en bestuur, behoeven een tijd van studie op universitair niveau.

Aan de commentaar, die mevrouw L. PETRY-LEONE, Chief Nurse, United States Public Health Service, ter samenvatting van de gehouden bespreking gaf, zij het volgende ontleend:

„Of all the health professions nursing is perhaps the closest to people, closest to the largest number of people. It is this closeness which calls for depth of personal understanding, tenderness, sympathy, and constructive personal and community attitudes. The people to whom we nurses are close are of all ages, from birth to old age. They have varied social and economic backgrounds. They exhibit all degrees of health, from that robustness we strive to maintain to suffering from all the scourges man is heir to, which we nurses, under medical direction, strive to relieve. We are close to people in their homes, in health centres, in hospitals, in the workshop; to children in schools; to people as they work together for health in community groups. Here, in this closeness, lies the justification for our learning principles of social sciences to apply in human relationships. As the definition of health is broadened and as modern science advances, the responsibilities of nursing, like those of medicine and public health, expand”.

Literatuur: ¹*Chronicle of the World Health Organization* (1956) **10**, 207.

J. J. VAN LOGHEM

INGEZONDEN

(Ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken, behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten)



NOODZAKELIJKE WIJZIGING SUBSTITUTIE-THERAPIE BIJ PATIËNTEN MET BIJNIE-INSUFFICIËNTIE, DIE EEN INFECTIE DOORMAKEN

In de afgelopen week hebben wij twee lijdens aan een hypofunctie van de bijnierschors door de ziekte van Sheehan verloren, doordat ze thuis een acute infectie doormaakten. In geen van beide gevallen werd de cortison-dosis verhoogd. In een geval werd ACTH toegediend.

Met nadruk wil ik erop wijzen dat deze patiënten in een analoge situatie verkeren als lijdens aan diabetes mellitus. Hierbij is het gewoonte te overwegen dat zij, in geval van een acute infectie, in een coma diabeticum kunnen geraken indien de hoeveelheid insuline niet tijdig wordt verhoogd. Bij patiënten met hypofunctie van de bijnierschors ontstaat de acute insufficiëntie echter veel sneller, en kan een infectieziekte, indien niet voldoende substitutie wordt gegeven, in enkele uren dodelijk zijn. De nieuwe mogelijkheden voor een adequate substitutie met cortison zijn voor deze patiënten beter dan voorheen, en moeten in een dreigende situatie ten volle profylactisch worden gebruikt.

Er zijn thans in Nederland vele patiënten bekend met een slechte bijnierschorsfunctie, veroorzaakt hetzij door een hypofysair proces, door hypofysectomie, door ziekte van Addison,

of doordat zij lange tijd zijn behandeld met cortison, hetgeen tot bijnierschors-atrofie leidt. Deze patiënten moet worden ingeprent dat substitutie met bv. 25-50 mg cortison onvoldoende is tijdens een infectie of bij een operatie. De dosis moet dadelijk worden verhoogd tot 100 a 200 mg of zelfs meer in de eerste 24 uur, en er moet contact worden opgenomen met de huisarts en het behandelende specialistische centrum. Dit laatste beschikt dan ook nog over de mogelijkheid, hydrocortison intraveneus toe te dienen. Het geven van ACTH in deze gevallen is onjuist, aangezien er geen enkele garantie bestaat voor een snelle en adequate reactie van de bijnierschors.

Leiden, 29 september 1956

A. QUERIDO

BRIEFWISSELING



RECLAME-DRUKWERKJE

Naar schatting een jaar geleden werd aan de artsen een drukwerkje gezonden in de vorm van drie oud-Engelse prentjes onder elkaar, in kleurendruk. Op het bovenste zag men een man staan spitten, het middelste toonde twee mannen die samen praatten, terwijl het onderste een balspel voorstelde, gespeeld door drie personen. De bijschriften luidden resp.: „One boy is a boy — Two boys are half a boy — Three boys are no boy”, of iets dergelijks. Om bijzondere redenen interesseert de ondergetekende zich voor dit plaatje; hij verzoekt degene, die daartoe in staat is, hem een exemplaar toe te willen zenden, ofwel hem de naam te willen opgeven van de firma, die het uitgaf. Hiervoor zou hij zeer erkentelijk zijn.

A. RA. WIERDSMA

Dr. Claas Noorduynstraat 1, Nijmegen

BERICHTEN



BUITENLAND

AUSTRALIË. — VESTIGING VAN BUITENLANDSE ARTSEN. Naar aanleiding van een artikel in de *Nieuwe Rotterdamse Courant* van 22 augustus over moeilijkheden, ondervonden door buitenlandse artsen, die zich in Australië wensden te vestigen, heeft de Australische ambassade de volgende inlichtingen verstrekt:

De voorwaarden voor het praktizeren van artsen verschillen in de zes staten van Australië. Elke staat bezit echter een medische autoriteit, bij welke alle artsen zich moeten laten registreren. Dokters, die een artsdiploma bezitten van een Britse universiteit of van een universiteit uit een van de landen van het Gemenebest, waarvan de diploma's erkend worden, krijgen meestal aanstonds hun registratiecertificaat. Artsen die elders hebben gestudeerd, moeten echter de drie laatste jaarlijkse examens van de Australische artsenopleiding overdoen. In de dichtbevolkte staten Nieuw-Zuid-Wales en Victoria kunnen evenwel buitenlandse medische specialisten met bijzondere kwaliteiten zonder Australisch diploma de artsenpraktijk uitoefenen. In Queensland kunnen sinds kort Europese dokters na een theoretisch en praktisch examen ten overstaan van universitaire examinatoren als artsen worden geregistreerd, mits zij bovendien twaalf maanden verplicht intern dienst in een ziekenhuis hebben gedaan.

De staten Nieuw-Zuid-Wales, West-Australië en Tasmanië hebben enkele malen aan een klein aantal Europese artsen vergunningen verstrekt, om in landelijke gebieden te praktizeren. De federale regering heeft aan ongeveer 40 Europese dokters toegestaan als arts werkzaam te zijn in het territorium Papoea-Nieuw-Guinea (*Nieuwe Rott. Ct.*, 12 sept. 1956).

DUITSLAND. — ONDERBREKING VAN DE ZWANGERSCHAP WEGENS RHESUS-INCOMPATIBILITEIT. — De leider van het Max-Planck-Instituut voor erfelijkheidsbiologie en pathologie wijst erop, dat foetale erythroblastosen, die het gevolg zijn van een serologische incompatibiliteit — tegenstoffen bij de Rhesus-negatieve moeder tegen de Rhesus-positieve vrucht — niet berusten op enigerlei ziekelijke afwijking van de erfelijke aanleg. Een eugenetische indicatie tot onderbreking van de zwangerschap laat zich uit het Rhesus-vraagstuk dus niet afleiden. Een medische indicatie, ter behandeling van vrouwen, die met een hoog gehalte aan tegenstoffen reeds enige dode of ernstig zieke kinderen ter wereld hebben gebracht, is echter verantwoord. Volgens de schrijver mag men verlangen, dat de Bondsrepubliek zulks wettelijk mogelijk maakt (*Münch. med. Wschr.* 1056, bl. 1201).