

of doordat zij lange tijd zijn behandeld met cortison, hetgeen tot bijnierschors-atrofie leidt. Deze patiënten moet worden ingeprent dat substitutie met bv. 25-50 mg cortison onvoldoende is tijdens een infectie of bij een operatie. De dosis moet dadelijk worden verhoogd tot 100 a 200 mg of zelfs meer in de eerste 24 uur, en er moet contact worden opgenomen met de huisarts en het behandelende specialistische centrum. Dit laatste beschikt dan ook nog over de mogelijkheid, hydrocortison intraveneus toe te dienen. Het geven van ACTH in deze gevallen is onjuist, aangezien er geen enkele garantie bestaat voor een snelle en adequate reactie van de bijnierschors.

Leiden, 29 september 1956

A. QUERIDO

## BRIEFWISSELING



### RECLAME-DRUKWERKJE

Naar schatting een jaar geleden werd aan de artsen een drukwerkje gezonden in de vorm van drie oud-Engelse prentjes onder elkaar, in kleurendruk. Op het bovenste zag men een man staan spitten, het middelste toonde twee mannen die samen praatten, terwijl het onderste een balspel voorstelde, gespeeld door drie personen. De bijschriften luidden resp.: „One boy is a boy — Two boys are half a boy — Three boys are no boy”, of iets dergelijks. Om bijzondere redenen interesseert de ondergetekende zich voor dit plaatje; hij verzoekt degene, die daartoe in staat is, hem een exemplaar toe te willen zenden, ofwel hem de naam te willen opgeven van de firma, die het uitgaf. Hiervoor zou hij zeer erkentelijk zijn.

A. RA. WIERDSMA

Dr. Claas Noorduynstraat 1, Nijmegen

## BERICHTEN



### BUITENLAND

AUSTRALIË. — VESTIGING VAN BUITENLANDSE ARTSEN. Naar aanleiding van een artikel in de *Nieuwe Rotterdamse Courant* van 22 augustus over moeilijkheden, ondervonden door buitenlandse artsen, die zich in Australië wensden te vestigen, heeft de Australische ambassade de volgende inlichtingen verstrekt:

De voorwaarden voor het praktizeren van artsen verschillen in de zes staten van Australië. Elke staat bezit echter een medische autoriteit, bij welke alle artsen zich moeten laten registreren. Dokters, die een artsdiploma bezitten van een Britse universiteit of van een universiteit uit een van de landen van het Gemenebest, waarvan de diploma's erkend worden, krijgen meestal aanstonds hun registratiecertificaat. Artsen die elders hebben gestudeerd, moeten echter de drie laatste jaarlijkse examens van de Australische artsenopleiding overdoen. In de dichtbevolkte staten Nieuw-Zuid-Wales en Victoria kunnen evenwel buitenlandse medische specialisten met bijzondere kwaliteiten zonder Australisch diploma de artsenpraktijk uitoefenen. In Queensland kunnen sinds kort Europese dokters na een theoretisch en praktisch examen ten overstaan van universitaire examinatoren als artsen worden geregistreerd, mits zij bovendien twaalf maanden verplicht intern dienst in een ziekenhuis hebben gedaan.

De staten Nieuw-Zuid-Wales, West-Australië en Tasmanië hebben enkele malen aan een klein aantal Europese artsen vergunningen verstrekt, om in landelijke gebieden te praktizeren. De federale regering heeft aan ongeveer 40 Europese dokters toegestaan als arts werkzaam te zijn in het territorium Papoea-Nieuw-Guinea (*Nieuwe Rott. Ct.*, 12 sept. 1956).

DUITSLAND. — ONDERBREKING VAN DE ZWANGERSCHAP WEGENS RHESUS-INCOMPATIBILITEIT. — De leider van het Max-Planck-Instituut voor erfelijkheidsbiologie en pathologie wijst erop, dat foetale erythroblastosen, die het gevolg zijn van een serologische incompatibiliteit — tegenstoffen bij de Rhesus-negatieve moeder tegen de Rhesus-positieve vrucht — niet berusten op enigerlei ziekelijke afwijking van de erfelijke aanleg. Een eugenetische indicatie tot onderbreking van de zwangerschap laat zich uit het Rhesus-vraagstuk dus niet afleiden. Een medische indicatie, ter behandeling van vrouwen, die met een hoog gehalte aan tegenstoffen reeds enige dode of ernstig zieke kinderen ter wereld hebben gebracht, is echter verantwoord. Volgens de schrijver mag men verlangen, dat de Bondsrepubliek zulks wettelijk mogelijk maakt (*Münch. med. Wschr.* 1056, bl. 1201).