

Rhizoma calami, folia melissae, rhizoma graminis, herba equiseti.

72. *Nervinumkruiden* (NATTERMANN en Co, Keulen).

Flores aurantii, flores humuli lupuli, flores helichrysi, folia melissae, folia menthae piperitae, folia rosmarini, fructus anisi, fructus foeniculi, radix liquiritiae, flores lavandulae, NaBr.

73. „Mur” (Israël) (voor bereiding van pleisters).

Een mengsel van mirre en ammoniacum.

74/75. *Klier-, nier- en stofwisselingsafwijkingen* (Bos, 's-Gravenhage).

no. 69: Flores calendulae, herba visci, herba equiseti.

no. 17: Rhizoma curcumae, flores lavandulae, herba eupatoriae, herba solidaginis, onbekende wortel (weinig).

76. *Nerva-tabletten tegen „zenuwen”* (Bos, 's-Gravenhage).

Radix valerianae, herba millefolii, fructus hordei decoricati en vermoedelijk nog weinig radix liquiritiae.

77. *Nerva-tabletten tegen „aandoening van de hypofyse”* (Bos, 's-Gravenhage).

Radix valerianae, herba millefolii, amyllum solani.

78. *Aandoening van de hypofyse, kruiden no. 56* (Bos, 's-Gravenhage).

Folia menthae, folia salviae, herba millefolii.

79. *Brilcompres Sunny* (JOHN FRANCIS).

Flanellen zakje in brilmodel, inhoudende flores chamomillae (verontreinigd o.a. met gramineeën).

80. *Psoriasis* (kruidenspecialist, Hilversum).

Fructus iuniperi, herba veronicae, radix valerianae, folia urticae, herba saponariae.

81. *Amyotrofische laterale sclerose* (kruidkundige, Putten).

Folia rosmarini, radix valerianae, folia farfarae, folia menthae piperitae, herba melissae.

INGEZONDEN

(Buiten verantwoordelijkheid der Redactie; ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten).

PREVENTIE VAN KINDERVERLAMMING

Als dierenarts-hygiënist werkzaam in de Vleeskeuring, heeft het mij getroffen dat voor de preventie van o.a. kinderverlamming sterk werd aangedrongen op het veelvuldig wassen van de handen, in het bijzonder na toiletbezoek. Ware het dan niet gewenst bij de tegenwoordige nieuwbouw het aanbrengen van een wasgelegenheid in de WC verplicht te stellen?

Hoogeveen, 6 februari 1957

S. LOMAN

BERICHTEN

BUITENLAND

DUITSLAND. — TEVEEL STUDENTEN IN DE GENEESKUNDE. Door middel van de pers wijst de „Deutsche Aerzteschaft” de abiturienten der instellingen van voorbereidend hoger onderwijs erop, dat de studie der geneeskunde een onzekere toekomst biedt. Het „Statistische Bundesamt” te Wiesbaden heeft berekend, dat 1300 studenten in de geneeskunde per jaar later een bestaan zouden kunnen vinden. Maar het feitelijke aantal is jaar op jaar tweemaal zo groot, „sodass es ausgeschlossen erscheint, dass auch nur ein wesentlicher Teil derer, die heute Medizin studieren wollen, einmal den Arztberuf wird ausüben können” (*D. med. Wschr.*, 1 maart 1957, bl. 333).

ENGELAND. — „SIX WEEKS IN, SIX WEEKS OUT”. Dit stelsel van uithuizigheid wordt met goed gevolg toegepast in de geriatrie afdeling van een Londens ziekenhuis. Een der

artsen bezocht in 1955 902 huishoudens uit welke opnemings voor een bejaarde zieke was aangevraagd. In 120 gevallen was de onafgebroken zware druk op het huishouden de beweegreden tot de aanvraag. In menig gezin bedoelde men dan ook slechts een tijdelijke ontlasting en wenste men voor alles eens goed uit te slapen. Aldus leidde de uitkomst der enquête tot de inrichting van een afdeling, bestemd voor patiënten, die afwisselend zes weken in het ziekenhuis en zes weken thuis worden verpleegd (*Lancet* 23 febr. 1957, bl. 418).

FRANKRIJK. — CONGRES VOOR THALASSOTHERAPIE. Het Xe „Congrès international de thalassothérapie et d’hydroclimatologie” zal 6, 7, en 8 april 1957 te Cannes worden gehouden. Inlichtingen verstrekt Dr. GEORGES DE LA FARGE, Institut de Bioclimatologie, te Cannes.

VERENIGDE STATEN. — EEN NATIONAAL ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VAN ZIEKTE. De „Public Health Service” begint in mei een „national survey of sickness”. Sinds januari doet men een vooroefening te Charlotte N.C., in het bijzonder ter vaststelling van een bruikbare vragenlijst bij het onderzoek huis aan huis (*J. Amer. med. Ass.*, 19 jan. 1957, adv. bl. 22).

— DE UITKOMSTEN VAN LEUKOTOMIE. Een autoriteit op het gebied der leukotomie, WALTER FREEMAN, sprak in de sectie voor psychiatrie van de Royal Society of Medicine te Londen (*Proceedings*, februari 1957, bl. 79) over de uitkomsten der operatie in de loop van 20 jaar. Aan de jongste statistieken betreffende de transorbitale werkwijze, toegepast bij 744 patiënten, ontleende hij de volgende cijfers: sterfgevallen 21, niet verbeterd 227, verergerd 39, verbeterd, doch niet voldoende voor ontslag 112, verbeterd, doch geen gezin ter ontvangst 77, verbeterd uit het ziekenhuis ontslagen en niet teruggekeerd 268. Hoe eerder de patiënt wordt geopereerd, des te groter is de kans, dat hij voldoende hersteld in zijn gezin kan terugkeren.

J. J. VAN LOGHEM

BINNENLAND

OPENING ST. JOZEF ZIEKENHUIS TE DEVENTER. — *Ons Ziekenhuis* (No. 2 bl. 33 e.v.) bevat een beschrijving van het op 2 februari jl. officieel geopende nieuwe St. Jozef Ziekenhuis te Deventer. Het is gebouwd volgens een gecombineerd systeem van paviljoen- en blokbouw. Het ziekenhuis biedt thans plaats voor ongeveer 230 bedden, maar het is berekend voor 350 bedden.

TWEDE ARTS OP AMELAND. — *Het Vrije Volk* (8 maart ed. Friesland) bevat het bericht dat er met ingang van 18 maart twee artsen op Ameland zullen zijn, te weten een arts te Nes, en een te Ballum.

STERFTETAFELS VOOR NEDERLAND VOOR DE PERIODEN 1951-1955 en 1953-1955. — Uit een mededeling van de Persdienst van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat het Centraal Bureau voor de Statistiek een publikatie het licht heeft doen zien met nieuwe sterftetafels.

In aansluiting op de in 1954 gepubliceerde tafels op grond van de sterfte in de jaren 1950-1952 zijn thans overeenkomstige tafels voor de periode 1953-1955 berekend en daarnaast nog tafels over de vijfjarige periode 1951-1955.

Blijkens de verkregen resultaten zijn de sterftetekansen opnieuw lager geworden en is de gemiddelde verwachte levensduur toegenomen.

Volgens de sterftetafels 1953-1955 bedraagt deze thans voor een pasgeboren jongen 71,0 en voor een pasgeboren meisje 73,9 jaar, tegen resp. 70,6 en 72,9 jaar volgens de