

sluitingen kan de angiografie een belangrijk diagnostisch hulpmiddel zijn.

C. L. P. TRÜB en W. BOESE, *Listeria monocytogenes* (Pirie) im Regierungsbezirk Düsseldorf. — Bespreking van 11 gevallen van listeriosis bij volwassenen en 9 gevallen bij doodgeborenen kinderen in West-Duitsland, in het gebied van Düsseldorf.

O. HORNSTEIN, *Über Skeletveränderungen beim Morbus Bourneville-Pringle*. — Casuïstische mededeling. In het skelet werden haardvormige bindweefselgebieden gevonden met als gevolg ontwikkelingsstoornissen.

R. LOTMAR, *Über die Anwendung der Isotopenmethode in der Balneologie. Überblick über die im Institut für Physikalische Therapie der Universität Zürich durchgeführten Untersuchungen unter Verwendung von radioaktiv markiertem Natriumsulfat (³⁵S)*. — Resorptie en afgifte van radioactief (gemerkt) natriumsulfaat door de huid werd bepaald bij konijnen. Vooral „actieve” koolstof is een middel om de huid tot sterke afgifte te dwingen.

F. J. ROSENBAUM, *Gefahren und Kontraindikationen der Laparoskopie besonders der Leber- und Milzpunktion*. — De punctie van lever en milt mag slechts zelden als ongevaarlijk worden beschouwd bij ziekten, die deze ingreep wenselijk zouden maken.

SCHWEIZERISCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. 88e Jrg. No. 5, 1 februari 1958.

H. KRAYENBÜHL, *Das Kleinhirnhämangiom*. — Uitvoerig klinisch-pathologisch overzicht.

TH. BÉRAUD, J. CRUCHAUD en A. VANNOTTI, *Influence du support protéique spécifique de la thyroxine sur sa pénétration dans la cellule*. — Onderzoek bij ratten leerde dat thyroxine door een bepaalde serum-eiwitfractie kan worden gebonden, waardoor hij niet meer in het weefsel doordringt.

W. NUSSBAUM, *Beitrag zur Epidemiologie der Bangschen Krankheit*. — Uitvoerig verslag van klinische en epidemiologische bevindingen in het kanton Bern.

N. PULT, *D-Cycloserine synthétique. Nos expériences dans le traitement de la tuberculose pulmonaire*. — Uitvoerige bespreking van ervaringen bij 32 patiënten, die gedurende 1 tot 6 maanden zijn behandeld met 1 g cycloserine per dag.

Colloquium der Assistenten des Inselspitals, Bern (Redigiert von J. HODLER und H. COTTIER). — Klinisch-pathologische conferentie over een patiënt die was overleden aan chronische erysipelas en elephantiasis nostras streptogenes.

SCHWEIZERISCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. 88e Jrg. No. 6, 8 februari 1958.

H. ISLIKER, *Unspezifische, humorale Abwehrmechanismen*. — Gedegen overzicht.

B. L. VALLEE en J. H. R. KÄGI, *Zur Bedeutung des Zinks im Stoffwechsel*. — Opsomming van recent onderzoek.

CL. BOREL, H. RIJSER en J. FREI, *L'élévation de deux transaminases hépatiques considérée comme adaptation enzymatique du rat au régime carné*. — Onderzoekingen bij ratten.

M. GEISER, *Kritische Bemerkungen zur Frage der Cerclage von Torsions- und Schrägfrakturen des Schafiknochens, insbesondere der Tibia. Zugleich ein Beitrag zum Problem der Frakturheilung*. — Zowel op theoretische gronden als naar praktische ervaringen is de toepassing van cerclage bij fracturen sterk te ontraden.

N. PULT, *D-Cycloserine synthétique. Nos expériences dans le traitement de la tuberculose pulmonaire*. — Tuberkelbacillen worden ook resistent tegen D-cycloserine.

INGEZONDEN

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie; ter bevordering van spoedige plaatsing van de stukken behoudt de Redactie zich het recht voor, deze zo nodig te bekorten.)

AANVULLING VERENIGINGSVERSLAG

In het verslag van de Nederlandse Patholoog-Anatomen Vereniging (vergadering van 10 november 1956) moet aan de voordracht van R. O. VAN DER HEUL over „Osteogenesis imperfecta” het volgende gedeelte, waarin de conclusies vervat zijn, worden toegevoegd:

Het blijkt dus, dat bij osteogenesis imperfecta congenita zowel de desmale als enchondrale verbening is gestoord. De afwijkingen in de desmale verbening zijn voornamelijk van kwantitatieve aard. De enchondrale ossificatie wijkt op twee belangrijke punten af, nl.:

1 a. Er zijn slechts weinig osteoblasten en deze zijn weinig actief.

b. Er wordt slechts weinig osteoïd weefsel gevormd, en dit kleurt zich basofiel en metachromatisch. De enchondrale beenvorming is dus kwantitatief en kwalitatief gestoord.

2. De herordening van het gevormde beenweefsel blijft uit, zodat dit een primitief karakter houdt. Aangezien de herordening afhankelijk kan zijn van de kwaliteit van het beenweefsel, bestaat dus de mogelijkheid, dat de essentiële stoornis bij dit proces alleen in de functie der osteoblasten, later osteocyten dient te worden gezocht.

Literatuur: HEUL, R. O. VAN DER (1958) *Ned. T. Geneesk.* 102, 49.

Utrecht, 12 februari 1958 A. DE MINJER, *secretaris*

AANWIJZINGEN VOOR INZENDERS VAN KOPIJ

1. De kopij worde met de schrijfmachine geschreven, met brede kantlijn en veel ruimte tussen de regels (interlinie), in tweevoud; het papier mag slechts aan één zijde worden betikt. N.B. Het duplicaat dient als werkexemplaar op het Redactie-bureau, en kan, ook bij weigering van een artikel, niet meer aan de auteur worden teruggezonden.

2. Men besluite zijn artikel met een samenvatting in de vorm van een auto-referaat van ten hoogste 15 regels druks, zo mogelijk met vertaling van de samenvatting in het Engels.

3. Verwijzing naar literatuur beperke men tot het uiterste. De verwijzing geschiede door het noemen van de auteursnaam en het jaartal der publikatie. Aan het eind van het artikel is plaats voor een alfabetische literatuurlijst. Van iedere auteur noeme men eerst de achternaam, vervolgens voorletters, jaartal, naam van het tijdschrift of boek, jaargang of deelnummer, bladzijde. Voorbeeld:

DELPRAT, C. C. (1929) *Ned. T. Geneesk.* 73, 5125.

Bij meer dan één auteur: GERBRANDY, J., W. J. CRANSTON en E. S. SNELL (1955) *Ned. T. Geneesk.* 99, 258.

4. Het aantal figuren (tekeningen, foto's) beperke men zo veel mogelijk. De figuren worden op de clichéfabriek meestal verkleind, tot op 7,5 cm breedte, om ze in een kolom te kunnen passen. Lijntekeningen late men bij voorkeur door een beroepstekenaar in oostindische inkt vervaardigen; grafieken met oostindische inkt op blauw millimeterpapier (het laatste wordt niet meegeclieerd); foto's op wit, glad, glanzend afdrukpapier; röntgenfoto's kunnen ook als negatief worden aangeboden.