

VERGIFTIGING DOOR COLONspoeling MET SUBLIMAATOPLOSSING

Aangezien het mogelijk is, dat er zich bij colonspoelingen met een sublimaatoplossing 1:500, vergiftigingsverschijnselen voordoen, wil ik er de aandacht op vestigen, dat het gebruik van deze stof ter voorkoming van implantatiemetastasen beperkt dient te blijven tot rectosigmoid en rectum, en slechts gedurende 5 minuten moet worden volgehouden.

Leiden, 27 november 1962

M. VINK

LUES-REACTIES

Naar aanleiding van de lues-reacties in de panel-discussie, bewerkt door Dr. J. B. LIPS (1962) moge ik vermelden, dat in de jaren 1921-1928, waarin ik in het St. Franciscusgasthuis te Rotterdam (geneesheer-directeur P. SPAAPEN) werkte, bij alle patiënten die op de chirurgische afdeling werden opgenomen, als routine de lues-reacties werden nagegaan. Het resultaat in onze reeds toen al van leven bruisende havenstad was — door de talrijke „onverwachte vangsten” — gewoonweg verbijsterend. Reden waarom ik in mijn proefschrift (Leiden 1923) de stelling heb opgenomen:

„Het verdient aanbeveling, dat in de ziekenhuizen van alle klinische patiënten het bloedserum worde onderzocht volgens de reacties van Wassermann en Sachs-Georgi”.

Literatuur: LIPS, J. B. (1962) *Ned. T. Geneesk.* **106**, 2438.

Rotterdam, 1 december 1962

A. G. J. HERMANS

BEHANDELING VAN TETANUS-PATIËNTEN MET OVERDRUK VAN ZUURSTOF

Na de gedachtenwisseling tussen Prof. BOEREMA en VAN LEEUWEN (1962) worden de Nederlandse artsen voor de keuze gesteld of zij hun patiënten met tetanus ter behandeling met overdruk van zuurstof zullen aanbieden of niet. Zij dienen zich daarbij te realiseren, welke groep voornamelijk als verloren moet worden beschouwd.

Welnu, die bestaat uit de nimmer tegen tetanus ingeënte zieken, waarbij de incubatie-periode korter is dan 7 dagen.

Literatuur: LEEUWEN, A. M. VAN en I. BOEREMA (1962) *Ned. T. Geneesk.* **106**, 2556.

Amsterdam, 14 december 1962

J. E. MINKENHOF

BERICHTEN

BUITENLAND

Wereldberichten

Internationaal kinderpsychiatrisch congres. — Het *Maandblad voor de geestelijke Volksgezondheid* wijdde de november-aflevering aan een verslag van het internationale congres voor kinderpsychiatrie dat in de zomer van het afgelopen jaar te 's-Gravenhage werd gehouden. Voor elk der hoofdonderwerpen — algemene preventie, preventie van schadelijke somatische factoren, preventie van schadelijke psychosociale factoren, sociale actie — nodigde de redactie een of meer deskundigen tot samenvatting van de congresstof uit.

Engeland

Geneeskundige behandeling van thalidomide-slachtoffers. — Een orthopedisch chirurg van de universiteit te Oxford geeft in de *Lancet* van 24 november (bl. 1162) indrukken van zijn studiereis door Duitsland. De voornaamste centra ter behandeling van de misvormde kinderen zijn te Hamburg, Münster en Heidelberg ingericht. Te München bezocht hij een vergadering van de Deutsche orthopädische Gesellschaft, waar alle ervaringen ter sprake kwamen. „The

organisation of the care of these children is urgent, for in Germany the best results are obtained when the child begins to be fitted with artificial limbs at the time he would begin to make conscious use of his own limbs”.

De optimale leeftijd voor de eerste inenting tegen pokken. — Het ministerie van gezondheid heeft onlangs in een memorandum opnieuw uiteengezet dat ter voorkoming van verwickelingen van de primovaccinatie het van belang is, kinderen in te enten „during their first two years of life, but preferably during the second year” (cursivering door het ministerie). (*Brit. med. J.*, 24 november, bl. 1381).

Toetsing van geneesmiddelen bij drachtige dieren. — Het spreekt vanzelf dat de mogelijke teratogene werking van als geneesmiddelen aan de markt te brengen chemicalia in de toekomst stelselmatig zal worden nagegaan. Zoals uit verscheidene, ook in deze rubriek (bl. 1105, 2339) vermelde onderzoeken blijkt, is het speuren naar geschikte proefdieren in volle gang. Reeds waarschuwt men voor „pitfalls”: verschillen in vatbaarheid voor ziekte kunnen zich bij toxicologische proeven op drachtige dieren tussen stammen van één zelfde soort openbaren. (*Lancet*, 24 november, bl. 1116).

De farmaceutische industrie vraagt de instelling van een onafhankelijk controle-lichaam. — Zowel de regering als de Association of the British Pharmaceutical Industry onderzoekt op welke wijze het publiek tegen op de markt gebrachte schadelijke geneesmiddelen beter kan worden beschermd. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van een geneesmiddel dragen de producent die het ten verkoop biedt en de arts die het voorschrijft. Over een veiliger gang van zaken heeft de commissie van deskundigen die de minister van advies dient zich nog niet volledig uitgesproken; wel heeft zij het denkbeeld van een „drug-testing body under Government auspices” in een interim-rapport met beslistheid afgewezen, en aanbevolen de veiligheid te vergroten door de instelling van een „expert body to review evidence and offer advice on the toxicity of the new drugs”.

De commissie van deskundigen der bovengenoemde associatie van de farmaceutische industrie verlangt evenmin een „drug-testing body”. Zij beveelt de instelling van een „Advisory Centre of drug safety” aan. Dit „centre” moet volstrekt onafhankelijk zijn en in het bijzonder de taak hebben, toe te zien op de toelaatbaarheid van de klinische beproeving van de nieuwe producten en op verkregen resultaten. „The Advisory Centre of drug safety would review, with the help of impartial experts, all the data necessary to assess the safety of a drug at the time of issue to a medical consultant for use in clinical trials, and again when these trials have been satisfactorily completed and the drug is ready for general release. The essence of this scheme is that no new drug will be released until it has gone through this procedure”. (*Lancet*, 1 december, bl. 1175 en 1177).

Mislukte anti-rookcampagne bij schoolkinderen. — Op verzoek van het hoofd van een „secondary school” (leerlingen tussen 11 en 19 jaar) heeft een medical officer (Dewsbury) een proef genomen met een „health education campaign”, in het bijzonder gericht op de gevaren van het roken. Men onderscheidde „the advertising period” (waarschuwingen op aanplakbiljetten in woord en beeld), „the instructional period” en „the assessment period” (twee „interviews in private” met drie maanden tussen beide). Na beëindiging moest men erkennen dat „the intensive campaign of health education has failed to produce any significant change in the pattern of smoking in the secondary school”. De uitkomst bevestigt menige andere negatieve ervaring. Ook blijkt op-