

MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

FINANCIËLE STEUN DE DRIE LICHTEN

De Stichting „De Drie Lichten” nodigt gegadigden uit, vóór 15 oktober a.s. hun aanvragen in te dienen bij haar secretaris.

Steun kan worden verleend aan Nederlandse artsen, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op medisch gebied. Zulk een steun betreft bij voorkeur levensonderhoud van hen die een onderzoek zouden willen verrichten, doch daarvan door financiële omstandigheden worden weerhouden. Daarnaast komt ook in aanmerking het verschaffen van geld voor te maken onkosten, exclusief apparatuur. Voorts kan worden overwogen iemand in de gelegenheid te stellen hulppersoneel in dienst te nemen.

De aanvragen dienen een nauwkeurige omschrijving te omvatten van de doelstellingen en vergezeld te gaan van aanbevelingen.

Amsterdam, augustus 1963
Univ. Klin. v. Verlosk. & Gyn.,
Wilhelmina Gasthuis

G. J. KLOOSTERMAN,
secretaris

JAN DEKKERSTICHTING EN DR. LUDGARDINE BOUWMANSTICHTING

Namens de besturen van de in de titel genoemde stichtingen wordt hierbij medegedeeld dat aanvragen voor ondersteuning van geneeskundig werk wederom gaarne worden tegemoet gezien. De aanvragen, die gaarne worden verwacht vóór 15 oktober 1963, moeten aan beide stichtingen worden gericht.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de secretaris, bij voorkeur na 1 oktober.

Amsterdam, 9 september 1963
Holbeinstraat 45

Prof. Dr. H. T. DEELMAN,
secretaris

INGEZONDEN

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie; deze behoudt zich het recht voor, de stukken te bekorten)

KYSTEN IN DE BOVENKAAK

In een artikel van de tandartsen VAN DER KWAST en ROORDA (1963) over fissurale bovenkaakskysten vermelden de schrijvers uitvoerig de behandeling van een (globulomaxillaire) kyste die een groot gedeelte van de rechter bovenkaak innam (patiënte A).

Er werd tot orale (vestibulaire) kystostomie besloten. Deze ingreep is in de literatuur bekend als „operatie van Partsch I”, ook wel „operatie van Partsch” zonder meer (orale kystostomie, marsupialisatie). De „operatie van Partsch II” echter is de „gewone” kystectomie, dus een totale extirpatie.

Overigens is door de schrijvers helaas niet vermeld of er antranasale kystostomie overwogen werd. Hierbij wordt de kyste tot een bijholte van de sinus maxillaris gemaakt, met een behoorlijke opening naar de onderste neusgang. Deze methode verdient toch bij grote bovenkaakskysten in zeer vele gevallen de voorkeur.

Literatuur: KWAST, W. A. M. VAN DER en L. A. M. ROORDA (1963) Fissurale kysten in de bovenkaak. *Ned. T. Geneesk.* 107, 1479.

Amsterdam, augustus 1963

J. LEEUWENBURGH

BERICHTEN BUITENLAND

Canada

A gift from Holland. — De *Canadian medical Association Journal* van 27 juli (bl. 192) bevat de afbeelding van een penning, die in 1947, ter gelegenheid van de vergadering der internationale vereniging van vrouwelijke artsen te Amsterdam, aan de presidente der Canadese vereniging werd aangeboden. De penning toont ter herinnering aan de slag bij Arnhem een strijder en getuigt aan de keerzijde met een dichterlijk woord van de dankbaarheid van Nederland voor Canada's aandeel in de bevrijding van ons land en voor de gastvrijheid, aan het koninklijk gezin verleend. Deze gift werd aanstonds erkend als een presidentieel „insigne”, waarmee sedertdien telken jare de nieuwe Canadese presidente wordt onderscheiden.

Denemarken

Pogingen tot zelfmoord. — Het *Danish Bulletin* dat maandelijks een aantal oorspronkelijke mededelingen doet verschijnen, geeft in het juninummer dertien opstellen over vergiftigingen, in het bijzonder over de werking van barbituraten, psychopharmaca en fosforstygmijnen, en over de keuze van bepaalde middelen bij zelfmoord en poging tot zelfmoord. Uit een overzicht van de gevallen van poging tot zelfmoord, die in de jaren 1950-1962 in het Intoxication Center onder behandeling zijn gekomen, blijkt dat het aantal patiënten jaarlijks gemiddeld 800 bedroeg met een maximum van 978 in 1954 en een minimum van 735 in 1961. Al die jaren was allypropymal (aprobarbital) het meest gebruikte middel. Voor fenobarbital (Fenemal), koolmonoxyde en Hypnofer (aprobarbital en barbital in gelijke hoeveelheden) wijzigde zich de belangstelling in de loop der jaren niet. Fenobarbital wordt vaak gebruikt door epileptici en hun familieleden. Amobarbital (Pentymal) bereikte in 1955 een hoogtepunt; daarna nam het gebruik geleidelijk af. Sedert 1959 wordt ook meprobumaat vaak toegepast.

Duitsland

Waakzaam tegen mogelijke schadelijkheid van nieuwe geneesmiddelen. — De Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft en de Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin richten een dringend verzoek tot alle artsen „ihre Beobachtungen über Unverträglichkeiten oder Nebenwirkungen eines Arzneimittels — besonders eines neuen — oder auch den blossen Verdacht auf Nebenwirkungen der Arzneimittelkommission der Deutsche Ärzteschaft mitzuteilen. Nur die Sammlung aller Beobachtungen an einer zentralen Stelle ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Gefahren”. (*Dtsch. med. Wschr.*, bl. 1658).

Engeland

Jaarverslag van de Family Planning Association. — Het aantal consultatiebureaus van de Family Planning Association steeg van 366 in 1961 tot 392 in 1962. Het aantal bezoekers bedroeg in laatstgenoemd jaar 299.926. Orale contraceptiva worden in 163 bureaus voorgeschreven en 51 bureaus zijn ingericht op het maken van cervicale uitstrijkpreparaten. (*Brit. med. J.*, 17 aug., bl. 452).

Bulletin over alcoholisme. — De Camberwell Council on Alcoholism, die verleden jaar werd ingesteld, zal met de steun van *Family Doctor* een informatieblad verzorgen om verband te scheppen tussen artsen, godsdienstige organisaties, maatschappelijke werkers en anderen die betrokken zijn