

25 JULI 1964 NED. T. GENEESK. 108. II. 30

Met de schrijvers ben ik het eens dat de troebele lens zo goed mogelijk moet worden verwijderd en dat de cornea-
verwonding nauwkeurig moet worden verzorgd, met directe
hechting van de wondranden. Overhechting van een niet
gehechte cornea-wond is geen voldoende verzorging. De
overhechting met conjunctiva heeft echter niet slechts de
afsluiting van een lekkende wond tot doel, maar tevens een
zo goed mogelijke belemmering tegen secundaire infectie.
Juist na een trauma is deze overhechting bijzonder nuttig;
vaak bestaat immers nog een verwonding van de oogleden,
of een blepharitis, waarbij de kansen op infectie waarschijn-
lijk groter zijn. Ik zou daarom de indicatie voor overhechting
niet zo ver durven beperken als dit door de schrijvers ge-
beurt.

Literatuur: BINKHORST, C. D. en M. H. GOBIN (1964)
Ned. T. Geneesk. 108, 978.

Nijmegen, 2 juni 1964 J. E. A. VAN DEN HEUVEL

TWEE ZUSTERS MET HET SYNDROOM VAN STEIN-LEVENTHAL

Met enige verontrusting heb ik de casuïstische mededeling
van collega VAN EK (1964) gelezen.

Het verrichten van een wigexcisie bij twee jonge vrouwen,
die na hun menarche amenorroe hadden gekregen en op het
ogenblik van de operatie resp. 18 en 20 jaar oud waren,
zonder enige poging te doen om hetzij door een medicamen-
teuze, hetzij door een psychotherapeutische behandeling de
menstruatie weer te laten terugkeren, moet thans toch wel
als afkeurenswaardig beschouwd worden.

In de eerste plaats is het mogelijk, dat zonder enige be-
handeling na enige tijd de menstruatie weer terugkeert. In
de tweede plaats had deze operatie zonder enig bezwaar
uitgesteld kunnen worden tot de wens naar kinderen bij
deze meisjes naar voren zou zijn gekomen.

Het argument, dat het voor ongehuwde vrouwen nood-
zakelijk is amenorroe zo spoedig mogelijk op te heffen, ten
einde hun huwelijkskansen optimaal te maken, mist iedere
grond. In een gesprek kan men de jonge vrouw uitleggen
dat haar amenorroe vanzelf kan verdwijnen en indien dat
niet gebeurt, dat zij goed behandeld kan worden, indien zij
kinderen zou wensen.

Een ongehuwde vrouw, die regelmatig cohabiteert, zo
snel mogelijk haar fertiliteit terug te geven is een ondui-
delijk gemotiveerde handeling.

Literatuur: EK, K. H. VAN (1964) *Ned. T. Geneesk.* 108, 1307.
Amsterdam, 7 juli 1964 G. J. KLOOSTERMAN

ENKELE ASPECTEN VAN DE HANDDESINFECTIE

Bij de proeven, beschreven in hun artikel, gebruiken DE
VRIES en KNAPE (1964) ter reiniging en desinfectie der han-
den: alcohol 70 pct met 1 pro mille lavendelolie, met bac-
teriologisch gezien een zeer gunstig effect. Als praktisch na-
deel wordt aangevoerd dat de alcohol op de duur irriterend
werkt op de huid. „Door aan een liter alcohol 1 ml lavendel-
olie toe te voegen, kan men, zoals bij onze proeven bleek,
dit bezwaar volledig ondervangen”.

Waarschijnlijk verwarren de schrijvers de „vette” oliën
(= olea pinguis), zoals olijfolie, met de „vluchtige” oliën
(= olea volatilata), zoals lavendelolie. In tegenstelling tot de
vette oliën kan men zich van de vluchtige oliën nauwelijks
een huidirritatie-voorkomende werking voorstellen. Hoog-
stens kunnen vluchtige oliën sensibilisatie-verschijnselen ver-
oorzaken.

De toevoeging van lavendelolie aan alcohol is een van de
gebruikelijke methoden van de accijnsambtenaar om alcohol

te denatureren. Vermoedelijk verklaart dit ook hier de aan-
wezigheid van de 1 pro mille oleum lavandulae in de ge-
bruikte alcohol.

Literatuur: VRIES, P. J. DE, en M. KNAPE (1964) *Ned. T.
Geneesk.* 108, 1302.

Bennekom, 8 juli 1964

W. M. HAASBROEK

ZIEKTE VAN HODGKIN

Velen zullen de Nuttige Notitie no. 36 (1964) weer met ge-
noegen hebben gelezen. Een deel van de besproken moeij-
heden is m.i. afkomstig van het feit, dat de diagnose ziekte van
Hodgkin ondanks alle hulpmiddelen vaak moeilijk is. In
het hieronder weer te geven geval, dat fraai als tegenhanger
kan dienen is wél terstond aan de ziekte van Hodgkin ge-
dacht, maar deze gedachte is door een bijzondere omstan-
digheid verlaten:

Een longarts op een consultatiebureau voor tuberculose
(een „infraspecialist”?) ziet een mediastinale tumor bij een
patiënt met een grauw uiterlijk. Hij stuurt deze onmiddellijk
door naar een internist, omdat hij de ziekte van Hodgkin
of een lymfosaroom bij de patiënt veronderstelt. De inter-
nist is het hiermee geheel eens en neemt de man direct op.
Hij verzoekt zijn medewerkers, de diagnose te trachten te be-
vestigen. Deze slagen daarin niet en dragen de patiënt over
aan een klinisch werkzaam longarts in een ander ziekenhuis.
Op diens afdeling blijkt, dat de patiënt melk ophoest na melk
drinken, dat het sputum blauw is na het drinken van blauwe
limonade en rood na het drinken van rode limonade. Er
wordt een verbinding gevonden van de slokdarm naar de
rechter bovenkwabbronchus. Aan de ziekte van Hodgkin
denkt niemand meer. Een zeer ervaren chirurg verwijdert
rechter bovenkwab en fistel.

Enige dagen later ontstaat er empyeem rechts. Enige
weken later overlijdt de patiënt. De patholoog-anatoom
vindt bij sectie: ziekte van Hodgkin.

Literatuur: Nuttige Notitie No. 36 (1964) *Ned. T. Geneesk.*
108, 1219.

Heerlen, 4 juli 1964

A. C. APPELMAN

BERICHTEN BUITENLAND

Australië

Tandheelkundige nood. — De hoogleraar in preventieve
tandheelkunde aan de universiteit van Sydney sprak ter
gelegenheid van een conferentie, gewijd aan het Far West
Children's Health Scheme, over het gebrek aan tandartsen
in zijn land. Hun aantal blijft in groei ver achter bij de toe-
neming van de bevolking. De kinderen tussen 6 en 12 jaar
lijden gemiddeld aan meer dan een dozijn aangetaste elemen-
ten, een frequentie die met de jaren toeneemt. Kinderen van
drie jaar hebben gemiddeld reeds vier zieke tanden en op
zes- of zevenjarige leeftijd is reeds de helft van het gebit ziek.
Nieuw-Zuid-Wales bestudeert op verzoek van de regering
het vraagstuk der dental nurses, daartoe gemachtigd door
een onlangs aangenomen amendement van de Dental Act.
De nieuwe wet aanvaardt ook buitenlandse tandartsen met
andere diploma's dan die welke door de Australische uni-
versiteiten zijn erkend. De vreemdelingen worden voor een
bepaalde tijd in een bepaald gebied tot de praktijk toegela-
ten, en kunnen zich na afloop hiervan vrij vestigen. (*Med.
News*, 19 juni, bl. 7).

Engeland

Hervorming van de opleiding van de verpleegster. —
De Council of the Royal College of Nursing droeg in 1961