

stellen, vóórdat de zenuw elektromyografisch praktisch is „overleden”.

Terloops moge in dit verband worden opgemerkt, dat het elektromyografisch onderzoek niet in staat is ons in te lichten over de lokalisatie en over de uitgestrektheid van het zenuwletsel, eveneens factoren die voor de operatieve indicatie van belang zijn.

Ad 2. Zoals Prof. JONGKEES opmerkt, beschikken wij niet over betrouwbare statistische gegevens die ons inzicht kunnen geven in het nuttig rendement van de endotemporale decompressie. Wij pogen thans in samenwerking met anderen, op deze vraag een passend antwoord te geven; het zal Prof. JONGKEES genoegen doen, te vernemen dat wij het hiertoe vereiste onderzoek op korte termijn hopen af te sluiten.

Literatuur: JONGKEES, L. B. W. (1967) *Ned. T. Geneesk.* **III**, 1670. — VERJAAL, A. (1967) *Ned. T. Geneesk.* **III**, 1361.

's-Gravenhage, 1 oktober 1967

A. VERJAAL

DE BETREKKELIJKHEID VAN „VASTSTAANDE FEITEN”

Het feit dat corpuscarcinoom in toenemende frequentie wordt waargenomen in landen die een hoog welvaartspeil paren aan een dalend geboortecijfer is zo algemeen bekend dat de heer SCHÖPPING (1967) slechts enkele leerboeken over gynaecologie of pathologische anatomie had behoeven te raadplegen om zich hierover nader te oriënteren (bv. *Ned. Leerboek der Vrouwenziekten*, bl. 180). Verder kan ik hem verwijzen naar het artikel van mej. LEENDERTZ (1956).

Het rapport van H. SACHS en H. MAASS bevat geen enkel gegeven dat met het bovengenoemde in strijd is, maar vereist wel enig inzicht bij het raadplegen van de in dat rapport voorkomende getallen. Men moet namelijk weten dat de frequenties van corpuscarcinoom resp. cervixcarcinoom niet identiek zijn met de sterftcijfers, omdat de resultaten van de therapie voor de twee aandoeningen vrij sterk verschillen. Bovenal moet men weten dat vooral in ontwikkelingslanden patiënten met corpus- of cervixcarcinoom dikwijls zó laat onder behandeling komen, dat een vaststaande diagnose omtrent de oorsprongsplaats van het carcinoom niet meer mogelijk is, zodat dan met de diagnose uteruscarcinoom wordt volstaan.

Onbekendheid met deze feiten heeft de heer SCHÖPPING ertoe gebracht de op zichzelf juiste gegevens van het door hem aangehaalde rapport onjuist te interpreteren.

Literatuur: LEENDERTZ, G. A. (1956) *Ned. T. Verlosk.* **56**, 349. — SCHÖPPING, J. M. (1967) *Ned. T. Geneesk.* **III**, 1723.

Amsterdam, 2 oktober 1967

G. J. KLOOSTERMAN

BERICHTEN

BUITENLAND

Wereldberichten

Onderzoek van kankergezwellen bij dieren. — Op initiatief van kankeronderzoekers te Washington besloten de instituten voor pathologie te Glasgow, Zürich, Bern, Monaco, Amsterdam en Londen samen te werken tot stichting van een internationaal centrum voor de studie van kanker van dieren, en allereerst een systematische classificatie van de kankergezwellen der huisdieren ter hand te nemen. (*Rif. med.*, 2 sept., bl. 980).

Afrika

Gele koorts. — In de loop der jaren heeft men ten aanzien van gele koorts menige indrukwekkende ervaring beleefd. Na de epidemiologische ontraadseling omstreeks het begin

van deze eeuw in Centraal-Amerika kwam de teleurstellende ontdekking dat *Aedes aegypti* niet als enige mug in het spel is, en dat gele koorts ook buiten de menselijke samenleving in het oerbos kan standhouden. Nu de ziekte in de laatste tijd in Afrika volle aandacht eist, blijken er wel enkele epidemiologische verschillpunten met Amerika te bestaan, zowel ter zake van *Aedes aegypti*, die in Afrika een ruimer gebied bestrijkt en minder beperkt is tot de nabijheid van de menselijke huisvesting, als ter zake van de „jungle yellow fever”. Het „mosquito-monkey complex”, bij voorbeeld, is in Afrika niet zo strikt gelokaliseerd binnen de grenzen van het woud door de eigenschap van sommige soorten apen, strooptochten tot in de nabijheid van de dorpen uit te strekken. *WHO Chronicle*, dat in het septemernummer (bl. 393) enige bladzijden geeft over het Afrikaanse vraagstuk, herinnert allereerst aan de verbijsterende epidemie van Ethiopië, toen men tussen de jaren 1960 en 1962 30.000 sterfgevallen en 200.000 ziektegevallen heeft geregistreerd, en aan de epidemie van Senegal (deze rubriek, bl. 1545 en *Bulletin van de Wereldgezondheidsorganisatie*, 1967, **36**, 113). Voorts wijdt genoemd maandschrift ook aandacht aan de gele koorts die in andere gebieden van Afrika is nagespeurd. Serologisch onderzoek toonde aan, dat de ziekte over een groot deel van Centraal- en Oost-Afrika (Kongo, Kenya, Oeganda) is voorgekomen en immunologische sporen heeft achtergelaten. Met deze gegevens is tevens bevestigd, dat gele koorts die herhaaldelijk in lichte en ernstige vorm heeft geheerst, een blijvend gevaar voor het werelddeel betekent. Tot op de huidige dag circuleert het virus ook in de oerbossen van Oeganda.

Engeland

Nieuw wettelijk toezicht op geneesmiddelen. — Men herinnert zich dat de regering spoedig na de thalidomide-ramp, in 1964 een commissie onder voorzitterschap van Dr. DERRICK DUNLOP heeft benoemd met de opdracht, een voorlopig toezicht op nieuwe geneesmiddelen te verwezenlijken, in nauw contact met de medische professie en de farmaceutische industrie (zie deze rubriek, bl. 1545). Intussen heeft de regering een witboek over het onderwerp voorbereid en zich daarbij allereerst rekenschap gegeven van „de farmaceutische revolutie” die zich de laatste dertig jaren heeft voltrokken, en van de mogelijkheid, indien Engeland zou deelnemen aan de Europese economische gemeenschap, ook op farmaceutisch gebied samen te werken. Overigens geeft het witboek aanbevelingen ter versterking van de bestaande wettelijke bepalingen: „to ensure that the product supplied to the customer is what he asks for, and that he is not misled by description and labelling or by unsupported therapeutic claims; and secondly, the law will provide, so far as possible, that doctors, dentists, veterinarians, and pharmacists can rely on the purity and efficacy of the substances they prescribe, supply, and use, and be fully informed about their properties — desirable and undesirable”. (*Lancet*, 16 sept., bl. 601).

Acetylsalicylzuur en bloedingen in het darmkanaal. —

De ervaring dat acetylsalicylzuur vaak lichte gastro-intestinale bloedingen veroorzaakt, vraagt telkens weer de aandacht. Het is wel duidelijk dat patiënten met ulcus pepticum „not necessarily” een groter kans op bloeding lopen en de uitbreiding van occulte bloeding in „a provocation test” heeft geen constante betrekking tot de waarschijnlijkheid van een sterker bloeding, maar enkele „key questions” zijn nog onbeantwoord. Hoe belangrijk is de regio van contact tussen het middel en de maagwand? Indien het tempo van de maaglediging mede de duur van het contact bepaalt, heeft de plaats van het ulcus en de uitgebreidheid van pyloro-