

Oogletsel na kermisbezoek

In dit tijdschrift verscheen onlangs een artikel van dr. S. DE GROOT (1981) uit Woudsend, waarin deze oogletsels beschreef bij een aantal jonge mensen, opgelopen na enkele ritten in de botsautootjes op de kermis. Uit een nader onderzoek is ons gebleken, dat dit in 1980 inderdaad is voorgekomen op een kermis in Friesland. De oorzaak bleek te zijn dat de omvormer-gelijkrichter, welke er voor zorgt dat er op het stroomnet geen vonken ontstaan, tijdens deze ene kermis defect was. De eigenaar van de autoscooter heeft toen onmiddellijk deze omvormer-gelijkrichter laten repareren, waardoor het probleem was opgelost. Alle eigenaars van autoscooters in Nederland zijn van dit voorval op de hoogte gesteld.

Literatuur: S. DE GROOT (1981) *Ned. T. Geneesk.* 125, 103.

Woudsend, februari 1981

B. DONKS, voorzitter
Bond van Kermisbedrijfhouders

Juist door de aanwezigheid van deze defecte omvormer-gelijkrichter kon verband worden gelegd tussen het grote aantal oogletsels en het rijden in botsauto's. Dit verband was nog niet eerder beschreven in Nederland. Het is verheugend dat de kermisexploitant het euvel heeft verholpen.

Overigens blijkt uit de reacties van artsen en huisartsen, die naar aanleiding van deze publikatie bij mij zijn binnengekomen, dat dezelfde voorvallen zich ook elders in Nederland hebben voorgedaan zowel vóór als na het gebeurde in Friesland. Onder andere meldde een huisarts mij dat hij de afgelopen acht jaar regelmatig tijdens de kermis in zijn woonplaats ongeveer 7 à 10 jongeren behandelt voor het beschreven oogletsel, opgelopen tijdens het rijden in botsautootjes. Eén oogarts vertelde dat hij zelf het letsel had opgelopen nadat hij deze kermisattractie had bezocht. Navraag bij de gemeentelijke instanties leert, dat het hier niet gaat om één en dezelfde autoscooterexploitant.

In West-Duitsland is tien jaar geleden naar aanleiding van het veelvuldig voorkomen van oogletsel na het rijden in autoscooters op een kermis een onderzoek gelast door de overheid en zijn de veiligheidsvoorschriften aangepast. Sindsdien zijn in de Bondsrepubliek aldus veroorzaakte oogletsels afgenomen. Het is te wensen dat dit ook in Nederland gebeurt.

Woudsend, februari 1981

S. DE GROOT

Algehele verdoving bij kleine heelkundige ingrepen

Algemene anesthesie zou wel een vaak onverantwoorde luxe kunnen blijken te zijn, schrijft JONGKEES (1981) in zijn commentaar. Schrijver dezes kent een heelkundige collega met ruime ervaring in anesthesiologische technieken. Ondanks zijn kennis van zaken meende deze dat lokale anesthesie die vorm van anesthesie was, waarbij het lokaal met gebrul gevuld werd. De ontdekking door patiënten en heelkundigen, dat algemene verdoving en plaatselijke gevoelloosheid, mits toegediend door een ter zake kundige, een

verantwoorde luxe blijken te zijn, heeft kennelijk tot frustraties bij Jongkees geleid.

De vriendelijke aanhef van het artikel gaat over in een misplaatst sarcasme wanneer volgens Jongkees de gezamenlijke anesthesiologen (verenigde of officiële anesthesiologen zo u wilt) van mening zijn, dat de gehele handeling, waarbij het bewustzijn van de patiënt moet worden verlaagd, aan een speciaal daartoe opgeleide specialist moet worden toevertrouwd. Ik vraag me af of de man met de hamer bedoeld wordt. Hierna wordt een voorbeeld aangehaald van een heelkundige collega, wiens werk hinderlijk ontwricht wordt door de anesthesist. De collega beschikte kennelijk over geroutineerde verpleegkundigen die in staat waren bij patiënten het bewustzijn te doen dalen of narcose te geven aan patiënten. Vervolgens spreekt Jongkees namens alle heelkundige collega's, wanneer hun berichten bereiken en zij in hun land geen behoefte hebben aan de bereleving van het gilde-idee.

Wij, beroepsanesthesisten, officieel opgeleide narcotiseurs en erkende narcosespecialisten, mogen nu kiezen tussen machtsvertoon of overleg met de concurrent. En dat is dan de schuld van een overheidsorgaan als de Gezondheidsraad. Jongkees vindt kennelijk dat er risico's kleven aan algemene narcose indien hij suggereert dat de goed geïnformeerde patiënt wellicht van die luxe géén gebruik zou maken om de opererende arts rustig zijn chirurgische werk te laten doen.

Nogal eens blijkt dat soms ook door gebrek aan oefening van de narcotiseurs bij vaak spoedeisende ingreepjes, zij het onderhouden van een toestand van kunstmatige rust bij de patiënt niet aankunnen.

Tenslotte blijkt een enkele keer, en dat is eigenlijk het belangrijkste punt in de verhouding tussen anesthesisten en chirurgen, dat aan de eisen van de heelkundige collega niet voldaan kan worden.

Absurditeiten als verkondigd in dit onnodig scherpe commentaar van Jongkees heeft schrijver dezes in zijn Leidse opleidingstijd tot anesthesist, noch in zijn huidige werkkring meegemaakt. Gelukkig betreft het slechts sommige anesthesisten en enkele heelkundige collega's. Anesthesisten zullen door het commentaar van Jongkees gesterkt worden in hun mening dat zij en alleen zij de kennis en de kunde hebben (en nu ook het recht) „verdovingen” te verzorgen.

Literatuur: JONGKEES, L. B. W. (1981) *Ned. T. Geneesk.* 125, 237.

Breda, februari 1981

R. VAN SEVENTER

In het commentaar van L. B. W. JONGKEES (1981) merk ik nogal wat onlustgevoelens op over de algehele anesthesie door anesthesisten bij kleine heelkundige ingrepen. Als er goede afspraken in een ziekenhuis gemaakt worden over het tijdstip waarop kleine ingrepen gedaan kunnen worden, hoeft een operateur niet bang te zijn dat er geen anesthesist is.

Ik weet dat er veel operateurs zijn die jarenlang kapjes hebben gegeven en pentothal hebben gespoten voor kleine ingrepen. Dit is geen argument om dit tot in lengte van jaren zo te houden; bovendien hebben de jongeren deze ervaring niet. Het gaat mij er niet om dat ik er aan twijfel of een operateur geen kapje kan hanteren en gas kan geven, want

dat kunstje kan elke aap leren, maar operateurs zijn ook gewone mensen en kunnen zoals elk ander maar één ding tegelijk doen. Dit houdt in dat zij, als zij aan de ingreep bezig zijn, de conditie van de patiënt niet goed in de gaten kunnen houden. Bovendien trek ik in twijfel of de operateur in staat is om eventuele complicaties adequaat op te vangen. Een operateur is niet bedreven in het intuberen onder moeilijke omstandigheden. Ook beschikt een operateur niet over getraind anesthesiepersoneel om hem bij te staan en ook niet over voldoende hulpapparatuur (Rapport Gezondheidsraad 1979).

Dat een kort durende inhalatie-anesthesie onbekend terrein is voor de anesthesist lijkt mij een stelling die onjuist is. Elke anesthesist geeft geregeld inhalatie-anesthesieën.

De belangen van de operateur en de anesthesist botsen vaak en dat is heel begrijpelijk. Het werk van de anesthesist is namelijk het tegenwerken van de operateur, want deze laatste doet een grote of een kleine aanslag op patiënt's lichaam. De anesthesist moet zorgen dat de patiënt deze zo goed mogelijk overleeft. Daaruit volgt dat de anesthesist tegen sommige houdingen tijdens de ingreep bezwaren kan maken. Als de operateur de operatie dan technisch niet kan uitvoeren, dan moet hij een andere methode kiezen. De conditie van de patiënt tijdens de ingreep is belangrijker dan de technische eisen van een operateur.

Of een ingreep onder lokale anesthesie of onder algehele anesthesie moet gebeuren is een zaak tussen operateur en de patiënt, maar als een patiënt een algehele narcose verkiest, dan moet deze gegeven worden door de anesthesist en dan zal blijken dat het geen onverantwoorde luxe meer is.

Literatuur: JONGKEES, L. B. W. (1981) *Ned. T. Geneesk.* 125, 237. – Rapport Gezondheidsraad (1979) Deel I, *Anesthesiologie*.

Oppenhuizen, februari 1981

R. J. STEUR

Het Ingezonden van collega Van Seventer spreekt voor zichzelf. Een betere ondersteuning van mijn betoog had ik niet kunnen wensen.

Met de eerste alinea van het Ingezonden van collega Steur kan ik mij in theorie best verenigen, in de praktijk echter niet. Juist kleine ingrepen moeten nogal eens zeer spoedig gebeuren en dat kan dan vaak niet op „het tijdstip waarop kleine ingrepen gedaan kunnen worden”. Zelfs niet als in een ziekenhuis de beste afspraken gemaakt zijn. Een spoed-tracheotomie, een myringotomie, een vreemd lichaam in de neus komt nooit volgens afspraak, er moet dan direct geholpen worden wegens levensgevaar of om patiënten pijn, angst en ellende te besparen door nodeloos wachten in spanning.

Zoals collega Steur zegt, operateurs zijn natuurlijk – net als anesthesisten – doodgewone mensen, maar doordat verschillende kleine ingrepen maar luttele minuten duren, hebben in de praktijk op dit punt nu juist nog geen aanwijsbaar slechte gevolgen plaatsgehad. Ik meen echter te weten dat anesthesisten, zelfs bij grote operaties, soms gedurende meer dan luttele minuten niet in die operatiekamer vertoeven. Het tekort aan anesthesisten, lees ik dan, is daaraan schuld.

Over de houding van de patiënt bij een ingreep kan ik kort zijn. Daarover hebben anesthesist en operateur soms verschillende denkbeelden, zodat zij daaromtrent wel eens in botsing komen. Ik ben dat geheel met collega Steur eens, maar als de anesthesist Steur dan zegt: „als de operateur de operatie dan niet kan uitvoeren wegens de techniek, dan moet (cursivering van L. J.) hij een andere methode kiezen”, zegt hij precies wat ik verfoei en aan de kaak stelde: de door

de anesthesist geëiste houding kan zo zijn, dat de operateur, wegens gevaar voor onnodig grote morbiditeit en sterfte de voorgestelde houding onaanvaardbaar vindt. Ook dan is overleg beter dan de uitdrukking: de ander moet. Dit is zeker het geval als op andere plaatsen anesthesisten met goed gevolg de algehele narcose wel op de door de chirurg gewenste wijze uitvoeren.

Tenslotte dat een chirurg „getraind anesthesiepersoneel” tot zijn beschikking heeft, berust op maatregelen door de anesthesisten ingesteld, die ik in mijn commentaar reeds noemde.

Amsterdam, februari 1981

L. B. W. JONGKEES

Ectopische uitmonding van de ureter

Bij het artikel van KOLFF en VAN HELSDINGEN (1981) zou ik een corrigerende opmerking willen maken. In hun beschouwing doen zij naar mijn mening de embryologie van de tractus genitalis van de vrouw tekort door te stellen dat de tubae uterinae, de uterus, de cervix uteri en het vestibulum vaginae uit de gangen van Wolff ontstaan. Dit is een halve waarheid. Zonder twijfel zijn bij de totstandkoming van zowel de mannelijke als de vrouwelijke tractus genitalis de gangen van Wolff nauw betrokken. Bij de man ontwikkelen ze zich tot de afvoerwegen van het sperma (ductus deferens, vesiculae seminales), maar bij de vrouw spelen ze een belangrijke rol bij de inductie van de buizen van Müller. Uit deze buizen van Müller (en niet uit de buizen van Wolff) ontwikkelen zich de tubae, uterus en het bovenste 4/5 deel van de vagina. Aangezien de gangen van Wolff óók bij de aanleg van de ureter een belangrijke rol spelen, is het niet verwonderlijk dat anomalieën van het uropoëtische en van het genitale apparaat in allerlei combinaties worden gezien. In dit verband meen ik de schrijvers van dienst te kunnen zijn door hen te wijzen op het proefschrift van KARAMAT ALI uit 1965.

Aan het commentaar van prof. SCHOLTMEIJER (1981) zou ik willen toevoegen, dat het voor de gynaecoloog van belang kan zijn in geval van onbegrepen fluor bij jonge meisjes een ectopisch uitmondende ureter in de differentiële diagnose op te nemen (VAN HALL 1968). Niet alleen een „vaginogram” maar ook een hysterosalpingogram kan een ectopische ureter aan het licht brengen (KRUYFF 1974).

Literatuur: HALL, E. V. VAN (1968) *Ned. T. Verlosk.* 68, 91. – KARAMAT ALI, M. H. (1965) *Extravesicale ureteruitmondningen bij de vrouw: een embryologisch-klinische beschouwing en een bespreking van 51 Nederlandse patiënten*. Proefschrift Groningen. – KOLFF, G. C. M. en P. J. R. O. VAN HELSDINGEN (1981) *Ned. T. Geneesk.* 125, 52. – SCHOLTMEIJER, R. J. (1981) *Ned. T. Geneesk.* 125, 58.

Leiden, januari 1981

H. KRUYFF

Dat de altijd boeiende en gecompliceerde problematiek van de congenitale urogenitale anomalieën weer eens onder onze aandacht werd gebracht door KOLFF en VAN HELSDINGEN (1981) en door SCHOLTMEIJER (1981) is buitengewoon nuttig. Enig commentaar vanuit gynaecologisch gezichtspunt lijkt echter wel gewenst.

Het artikel van KOLFF en VAN HELSDINGEN bevat een onjuistheid (ook onopgemerkt door SCHOLTMEIJER), als zij vermelden dat bij de vrouw „de tubae uterinae, de uterus, de cervix uteri en het vestibulum vaginae” ontstaan uit de gang