

AIDS massale en vaak onverwachte opportunistische infecties kunnen voorkomen. Verder wordt vastgesteld dat ook bij deze patiënt op verscheidene plaatsen Kaposi-sarcomen werden aangetroffen, overigens zonder dat deze tijdens de klinische observatieperiode werden gediagnostiseerd.

#### LITERATUUR

<sup>1</sup> Zegerius L, Speelman JD. Cryptokokkenmeningitis, herpes genitalis en orale candidiasis bij een homoseksuele man met een verworven immunodeficiëntie. Ned Tijdschr Geneesk 1983; 127: 817-20.

Amsterdam, juli 1983

J. BRAS  
M.E.I. SCHIPPER  
L. ZEGERIUS

## Acute myeloïde leukemie in de zwangerschap

Met belangstelling hebben wij het artikel gelezen van Van der Velden et al. mede door het zelf meemaken van „deze zeldzame gebeurtenis van deze maligne aandoening en zwangerschap”.<sup>1</sup>

Bij een 7 maanden gravida I (para 0) van 27 jaar werd de diagnose acute myeloïde leukemie (FAB-classificatie M<sub>4</sub>) gesteld. Bij de behandelende specialisten heerste er onzekerheid over de te volgen lijn; sommigen voelden voor afbreking van de zwangerschap, anderen voor toedienen van cytostatica. Wij gaven haar 1 chemo-therapiekuur volgens het LAM IV-schema waarna patiënte beviel van een premature zuigeling die na een korte periode in de couveuse, geheel ongestoord zonder hematologische afwijkingen

als gezond door de kinderarts werd afgegeven. Hiermede was het eerste deel van het „drieluik” bereikt.

Na de tweede behandeling volgend het LAM IV-schema en twee behandelingen volgens het LAM V-schema werd een complete remissie bereikt (2e deel van het drieluik). Bij HLA-typering van de broers en zusters, in totaal 15, werden twee broers en één zuster HLA-identiek bevonden.

In het Academisch Ziekenhuis te Leiden werd beenmergtransplantatie verricht, hetgeen aanvankelijk zich zo hoopvol liet aanzien dat patiënte van het isolatiepaviljoen werd overgeplaatst. Het voltooien van het drieluik na de wel geslaagde transplantatie, heeft helaas niet plaatsgevonden daar patiënte onder het beeld van interstitiële pneumonitis is overleden.

Zoals in het artikel staat, is de kans op bereiken van complete remissie 60-80% met een mediane overleving van 1 à 2 jaar. Daar de leeftijdsgroep der zwangeren gunstig ligt ten aanzien van beenmergtransplantatie is het naar onze mening alleszins de moeite waard om in de familie te kijken naar HLA-identieke leden.

Wij zijn ons bewust van het feit dat bij het niet slagen van de beenmergtransplantatie aan het gezin de kans wordt ontnomen dat gedurende ongeveer één jaar de moeder aanwezig is, maar gezien de verdere infauste toekomst zijn wij van mening dat het streven naar een beenmergtransplantatie hier zeker op zijn plaats is, daar de kans op genezing dan 50% is!

#### LITERATUUR

<sup>1</sup> Velden J van der, Lammes FB, Sintnicolaas K, Sizoo W, Stenfert Kroese WF, Löwenberg B. Acute myeloïde leukemie in de zwangerschap. Ned Tijdschr Geneesk 1983; 127: 744-8.

Alkmaar,  
Leiden, mei 1983

L.H. SIEGENBEEK VAN HEUKELOM  
F.E. ZWAAN

## BERICHTEN

### Buitenland

#### GROOT-BRITANNIË

*Bevordering van drugsverslaving door artsen.* – In Engeland werd het voorschrijven door artsen van heroïne en cocaïne ter beteugeling van het misbruik beperkt door de Dangerous Drugs Wet van 1967. Alleen speciaal daartoe bevoegde artsen die verbonden waren aan behandelingscentra voor verslaafden waren van dit verbod uitgezonderd. Het was gebleken dat – een weliswaar klein aantal – artsen een belangrijke rol speelden bij de verkrijgbaarheid voor verslaafden van cocaïne en heroïne. In de laatste jaren viel het op dat de ongewenste receptuur van de artsen niet is gestaakt, maar zich heeft gericht op het voorschrijven van andere verslavingsmiddelen zoals het opiaat Diconal en de wekamine Ritalin. Uit een enquête bleek dat verslaafden de behandelingscentra mijden en de voorkeur geven aan particuliere artsen. Deze laatsten komen beter aan hun wensen tegemoet en zijn gemakkelijker te benaderen. Sommige artsen bleken zelfs drugs te verkopen aan hun cliënten. De meerkosten die het artsenbezoek veroorzaakte werden door de gebruikers bestreden door de verkoop van een deel van het voorgeschrevene. Indien de General Medical Council er niet in slaagt de nieuwe ontwikkelingen te stuiten, adviseren de schrijvers alle verslavingsmiddelen

genoemd door de Advisory Council on the Misuse of Drugs onder de Misuse of Drugs Act 1971 te brengen. (T. Bewley et al. Br Med J 1983; 286: 1876-7.)

#### VERENIGDE STATEN

*Invloed van het dieet op ziekte van het perifere vaatstelsel.* – Van extreme diëten gaat een sterk suggestieve werking uit. Zo heeft het Pritikin-dieet, dat een gunstige invloed zou uitoefenen op de atherosclerose van het vaatstelsel, ruime bekendheid verworven. Het dieet heeft gerekend in kcal een zeer laag vetgehalte (5-10%), een hoog gehalte (70-75%) aan complexe koolhydraten (brood, aardappelen, peulvruchten) en een hoog vezelgehalte (40-45 g/1000 kcal) en een eiwitgehalte van 15-20%. Hutchison et al. (JAMA 1983; 249: 3326-38) vergeleken het effect van dit dieet met het mildere lipidemie-dieet van de American Heart Association (AHA) bij een groep van 45 patiënten (ca. 60 jaar oud) die leden aan perifere vaatziekten. Het AHA-dieet bevat calorisch 50-55% koolhydraten, 15-20% eiwitten, 25-30% vet, dat voornamelijk meervoudig onverzadigd is, en heeft een geringer vezelgehalte (25-30 g/1000 kcal). De patiënten werden aangemoedigd om minder te roken en minstens drie kwartier per dag te wandelen. Na een jaar kon men geen verschil vinden tussen beide patiëntengroepen in de daling van het lipidegehalte van het bloed. In de